

Coll. 702 in ~~coll.~~

Cat. inscrip. C. R.

coll. Rom. Socio. Im.

# AVICENNAE

## QVARTA FEN PRIMI

libri de uniuersali ratione meden

di: nunc primum. M. Iacob

mantini medici hebrei:

opera latinitate

donata.



M D

XXX



BIBLIOTECA NAZ.  
ROMA  
VITTORIO EMANUELE

ANDREE GRITI SERENIS. AC  
EXCELLEN. VENETIARVM  
PRINCIPI IACOB MAN/  
TINVS HEBREVS SE/  
CVNDAM OPTAT  
FORTVNAM.

**I**Nter eos q̄ hactenus Arabice de medica ar/  
te scripsere. Serenissime Princeps. clarissima  
oīum cōfessiōe. Primus Auicēnæ gloriæ locus  
attributus ē. Nā licet: q̄ cōposuit ab antiquiori  
bus: p̄sertim græcis copiosissime: ornatissime/  
q̄ tradita fuerit: ea tñ oīa doctissimus ipse fe/  
lici breuitate. in mirificū redegit ordinē. ita. ut  
eo docēte multo facilius q̄ aliis oībus: ea q̄ ad  
medēdi rōnē p̄tinet p̄cipi ualeāt. Quare uelut  
lege q̄dā s̄cītū ē. ut ī publicis gymnasiis Auic.  
op̄a maxima aīorū satisfactiōe legant. eiusq̄ li  
bri plurimos expositores habuerint: qđ nō itī  
dē cæteris obtigisse uidemus. Sed qm̄ Auicēna  
in scribēdo gentilitio ac sibi peculiari. Arabico  
idiomate usus est. quod a latinis hoībus: nō ita  
facile comparatur. eius operum traductio ma/  
ximis ac multis erroribus scatet. quos Andre/  
as Belunensis etatis nostræ medicus insignis  
& Arabica latinaq̄ ligua pariter eruditus: ma

gna ex parte laudabiliter emendauerit, alie-  
no tamen semine campum penitus expurgare  
non potuit, sed adhuc plura relicta sunt quæ  
ueluti nebula quadam ueritatem lectionis ob-  
ducant. Quãobrem ego qui nihil magis pro-  
prium hominis esse semper existimauerim, q̃  
quoquo modo uniuersis utilitatem conferre  
mortalibus, Quemadmodum pleraq; in ua-  
riis facultatibus ex hebraico in latinum sermo-  
nem conuerti, ita nunc aliquos Auicennæ cõ-  
mētarios aggressus, eos maculis omnibus emē-  
datos ac quo ad fieri possit, absolutissimos lati-  
nitate donatos, tanq̃ euidens animi mei indi-  
cium legentibus offerre decreui. Qui postq̃  
meam cum aliorum interpretationibus com-  
parauerint quid mihi debeant ipsi uiderint.  
Cum autem tres potissimum Auicennæ par-  
tes in gymnasiis publice legantur, uidelicet  
prima pars primi libri, quæ prima sen primi  
dicitur, & quarta, quæ quarta sen primi nun-  
cupatur ac prima pars quarti libri, quæ prima  
sen quarti appellatur ea omnia in latinā ora-  
tionem uertere proponens, à quarta sen pri-  
mi libri interpretari exorsus sum: quia hæc  
pars maiorem cæteris in uniuersali meden-  
di arte utilitatem asferre uidetur & hanc pri-  
mo in lucem edere uolui. Mox autem annu-  
ente deo optio max. ad reliquas expediendas

accingar. Cum uero oēs fere q̄ aliquñ litterari-  
um opus in lucē edere meditatur alicuius pa-  
trocinio comēdatū emittat. Idem mihi facere  
cogitāti, tua uere serenitas occurrit, quæ tanta  
est, ut quas cūq; animi tenebras atq; perturba-  
tiones solo intuitu discutere ualeat, Quando  
ea te pulchritudinē ac dignitate corporis exor-  
nari cōtigat: ut nemo te conspectior hactenus  
impasse credat, cui animi pulchritudo, tuum  
prudētia, tū cōsiliū maturitate ut effectus ipsi  
p̄bāt, ac oīum moralium uirtutū p̄bitas equæ  
rñdet. Tibiq; potissimū duabus de causis hāc  
editionē nostrā deberi arbitror: uel q̄a uñ flo-  
rentissimo studio patauino à puero fuerim  
semper addictus: nūc uero p̄cipue ob egregiā  
eorū eruditionē q̄ ibi publice profitentur: uel  
qm̄ Respub. cui tu merito præsides iustius an-  
tiq̄oribus p̄ponēda q̄ recētioribus cōparanda  
ita de me iā merita ē, ut oīa illi debeā: omnia  
optē. Ne uero indicēdo sim p̄lixior q̄ ipsa res  
postulare uidet̄. Has p̄nceps illustriss. tuo no-  
mini dicatas elucubratiōes suscipe tuaq; si op̄  
fuerit auctoritate defende. Nō quod eas te di-  
gnas existimē, Sed ut mea tibi mens aliquñ ma-  
nifesta fieret: q̄ publice, ac p̄uatim huic ciuitati  
p̄ uiribus inseruire p̄posuit, Nec tñ gratū ideo  
tibi minus me futurū spero, cū q̄ quod potest  
dat, oīa dedisse censerī debeat. Vale.

## FEN QVAR

TA PRIMI LIBRI AVICEN

NAE IACOBO MANTINO

HEBREO MEDICO IN

TERPRETE.

**F**en quarta de rationum medendi diuisione.  
ne. 31. capitibus distincta.

**C**aput primum fen quarte: sermo uniuersalis  
de medendi ratione.

**C**URATIONE. Aliquo triū perfi-  
ci dicimus, uel regimine & ipso uictu  
uel medicaminum usu, aut manus ar-  
tificio (quod chirurgia appellat) intelligo aut  
p regimē usum causarū necessariarū, que iam  
iuxta cōmunem consuetudinem enumeratz  
sunt: in qbus uictus ipse cōtinetur: Iudicia au-  
tem regiminis si eorum qualitatem spectes, si-  
milia plane sūt medicaminū iudiciis. Verum  
inter hęc, ipsa uictus ratio quoad quantitatē  
iudicia sibi propria habet: nam quādoq; ali-  
mentum tollimus, quādoq; minuimus, nō  
nunq; equamus, & interdū augemus, auferē

in totum alimentum, cum medicus cupit naturam uacare humorum coctioni. Minuitur ubi studet ut uires alimento conseruetur, et tū uirium curam habet. Vel fortasse minuitur ut materiæ prospiciatur, ne scilicet natura sit circa nutriuenti multitudinem impedita. Interim tamen semper cure sit id quod magis urget, ut quod prestatius sit, nempe. uires ipse, præsertim si admodū imbecilles fuerint. Cæterum alimentum dupliciter minuitur, quantitate, aut qualitate, aut si liceat tertium ex his duobus cōstituere modum, potes. Interest autē inter quantitatem, et qualitatem, quoniā interdum alimentum est multum in quantitate, parum nutriens tamen, ut sunt olera & fructus. Multiplicare enim hæc, est, multiplicare quantitatem alimenti non eius qualitatem. Et quandoq; alimentum est exiguum in quantitate multum tamen quoad nutritionē, ut sunt oua et testes pullorum gallinaceorū. Nos autē quandoq; qualitatem minuere, quantitatem uero augere cogimur, ut cum appetitus ad cibum uehemens fuerit, & in uenis humores crudi fuerint, ubi nos huiusmodi appetentiā replendo uentriculum, sedare curamus, illūq; humorē exuperantē a uenis arcere, ut si quid est in eis primo concoquant, aliisq; rationibus præter has id facimus. Nonnunq; etiam

qualitatem augere: quantitatem uero minue-  
re debemus: ut cum uires roborare cupimus:  
sed ipsa natura uentriculi imbecillior reddit:  
ut ad cōcoctionem pleniorē. se ualidam red-  
dere nequeat. Minorare autem uel auferre ali-  
mentum querimus. cum morbos acutos cura-  
mus. Nam etsi in diuturnioribus uictū quoq;  
minuamus; minus tamē q̄ in acutis: qm̄ uires  
magis obseruamus in morbis diuturnis. cum  
horū iudiciū ac uigorē: satis distare nō ignore-  
mus. q̄ nisi fieret. nequa q̄ posset usq; ad tēpus  
iudicii uirtus cōseruari: nec durāte diu tēpore  
concoctionis: concoquere quidē posset. At acu-  
torū morborū iudiciū propinquū est: ita ut an-  
te eorū uigorē uires ad modū dissolui nō dubi-  
temus. Vel si id timuerimus. non tamen usq;  
adeo alimentum minuemus. Cūq; egritudo p-  
pinquior fuerit p̄cipio: casusq; mitiores fue-  
rint: tunc egrum alemus. his quæ uires fouēt.  
Sed quando egritudo processerit: increſcēdo.  
casusq; ipsi augescere ceperint: tunc alimentū  
minuemus: tum quia in nostro precedenti ui-  
ctu: iam intrepide cōfidimus: tum etiam ut tē-  
pore quo uirtus certat: eā exoneremus. In ui-  
gore autem consistendi: uictum in extremo  
attenuare studebimus: & quanto morbus acu-  
tior eiusq; iudicium propinquius fuerit: tātō  
uictū magis attenuabimus: nisi aliq̄ supueneat



## CAPVT

rint causæ. quæ nos id agere impediunt: ut in particulari nostra cōmentatione id a nobis explicabitur: Alimentum insuper ea ratione qualitatibus: duo alia habet officia: nempe uel quod cito penetrat ut uinum. uel tarde: ut assata: & tosta: ad hæc aut quod id quoq; sanguis quod ex eo generat: est crasse ac tenacis substantie: ut est alimentum carnis porcine & uitulinæ: aut tenue & facile. aptum dissolui. ut est id quod ficibus uinoq; constat. alimento igitur quod cito penetrat indigemus: cum uitalem uirtutē deficientem: subleuare: eamq; excitare desideramus: ubi uenter aut uirtus non perficiunt concoctionē cibi tarde concoctionis: caue-  
bimus autē cibū concoctū facile: ubi contingat precessisse alimentum tarde cōcoctionis: timē dum enim est: ne illi admisceatur & ad illum. modum iam prius nobis expositum res reuertat. A crasso uero abstinebimus ubi metus impendit de obstructionum aduētū: alimentum tamen ualidissime nutritionis tardeq; concoctionis eligimus. ubi quempiam roborare eūq; ualidis exercitatiōibus tradere cupimus: sed leue preeligimus alimentum ei: qui in meatuum obstructionem facile incurrit.

Vsus autem medicaminum tres continet regulas: prima in eligenda qualitate ipsius medicaminis consistit: uidelicet uel calidi uel



frigidi uel humidi uel sicci: Secunda in quan-  
 titate deligenda: quæ quidem bifariam diuidi-  
 tur: nempe uel in mēsuram ponderis eius: uel  
 in metiendam eius qualitatem. hoc est gradū  
 caloris aut frigoris eius aut alterius id genus.  
 Tertia autem consideratio est ipse ordo tem-  
 poris eius: dirigit itaq; nos ad qualitatem me-  
 dicaminis simpliciter eligendam cognitio ge-  
 neris morbi. qm̄ cognita egritudinis qualitate  
 eligendum est medicamentum illi sua qualita-  
 te contrarium: cum morbus suo curetur con-  
 trario: sanitas uero suo simili seruetur. At mē-  
 sura quantitatis eius iuxta illos duos modos si-  
 mul: cognoscitur: coniectura artificiosa: ex mē-  
 bri natura magnitudieq; morbi & ex his quæ  
 sua cōuenientia. seu similitudine. id significāt  
 quæ quidem sunt maris ac femine differētia,  
 ætates, consuetudo: tempus anni: & regio: &  
 ars: & robur & habitus corporis atq; color. Ad  
 cognitionem autem nature mēbri q̄tuor sunt  
 cognoscēda. nempe membri tēperatura: eiusq;  
 formatio: positus: uiresq; ipsius. cognita. n.  
 naturalis membri temperatura simul cū mor-  
 bose temperaturæ magnitudine: coniectura  
 prorsus cognoscetur quantum quis recedat a  
 suo naturali temperamēto. ut sciatur quo nā  
 indigeat ut sibi restituatur: ut gratia exempli  
 si salubre temperamentū alicuius frigidū fuer

unde quæ-  
 ritur medic-  
 mali cap. 23  
 3m 83

maxima  
 quantitati  
 unde liqu-  
 su per.

artificiosa

## CAPVT

rit: morbus uero calidus. tunc is a sua tempera-  
 tura. magno distat recessu: magnaq; indige-  
 bit refrigeratione: q; si utrūq; calidum fuerit:  
 exigua refrigeratio satis erit. Cæterum quod  
 ad formationem ipsius particulæ attinet. iam  
 nobis dictum est: quot res in se includat: qua-  
 re recurratur ad eum locum. Hoc tamen te sci-  
 re licet: aliquod eē membrum quod ex sui for-  
 matiōe habet tam intra se q̃ extra faciles mea-  
 tus. unde tenui ac mediocri medicamie: excre-  
 mentum expellitur: aliquod uero aliud nō ita  
 se habet: quo fit: ut ualentius exigat medica-  
 men. Est & aliud fungosum: aliud uero den-  
 sum. Rarum autem: tenue medicamen deside-  
 rat. densum uero ualidiori indiget. Membra  
 præterea quæ ualidius medicamen postulant.  
 sunt: quæ ex neutra parte cavitatem aut inter-  
 capedinem habent: minus autem: quæ in alte-  
 ra tantum parte. Præterea minus quæ in utra-  
 q; parte conceptaculum obtinent: sed sunt dē-  
 sæ astrictæq; substantiæ: ut renes. minus iterum  
 quod utrinq; habet concauitatem: & est rare  
 substantiæ ut pulmo.

Per situm uero ut nosse intelligimus uel lo-  
 cum. uel consensum: notitia igitur communi-  
 cationis membri: tunc quidem maxime tibi  
 conducit. cum aliquod medicamen ad ali-  
 quam partem trahere: aut reducere decreue-

ris ueluti causa exēpli ubi materia in gibbosa parte iecinoris confederit, eam urina, ubi uero in caua, aluo euacuabimus: quoniam gibbosa epatis pars cum membris urinæ, et eius concaua cum intestinis communicatio, nem habent.

Notitia uero loci tripliciter opem fert primo quidem uicinitate uel distantia ipsius: nam si propinquus fuerit locus ut stomachus modica medicamenta ad eum peruenient in eundēq; agent. Sed si remotus ut pulmo uis pfecto medicamentorū mediocrium remittetur anteq̃ ad eum pertingent idcirco multo ualentiora pro eo requirūtur præsidia. At si uicina fuerit particula quam medicamentum pertingerit: tunc tanta debet esse uis illius medicamenti quanta morbo sit opposita. Sed si situs longius absit, ita ut si id medicamentū eo penetrare debeat magnā uim penetratiuā requirat, tunc plus æquo uim medicamenti augere oportebit, ut in emplastro coxendicis et cæteris aliis id genus fieri solet.

Secundo uero notitia eorum quæ admisceri debent medicamentis: ut cito ad membrum perueniant ueluti in medicamentis membrorum urine admiscantur quæ urinam ciant in cordialibus uero crocus.

## CAPVT

Tertio deniq; ut sciatur quomodo ipsi membro admouendum sit medicamen ut gratia exempli. Si ulcus in inferioribus intestinis insidere scierimus tum illud clysteri pertigimus & si in supremis id esse cōiecerimus tunc per ea que bibuntur.

Nōnūq; adhuc obseruare locum & consensū simul sumopere cōducet ueluti cum materia iam perfecte fluxerit ad membrum quid nam agere nos cōuenit ubi uero materia adhuc fluit quid iterum nos agere deceat nam si adhuc fluat eam a suo auertemus loco: quatuor tamen conditionibus prius consideratis.

Prīa est ad ptē oppositā auersio quā antispa sin grāci dicunt, ut cū ex dextra ad leuā reuelimus ptē, sursumq; ab his que infra sūt & cōtra. Secundo si consensum seruaueris, ut mensib9 confertim erumpentibus, eos quidem sistes, si magnas cucurbitas sub māmīs defixeris tanq̃ ad affinem locum reuocans.

Tertio pars e regione sita inspicienda est ut cū in iocinoris affectibus uenā brachii dextri internā ( quā basilicam appellant ) incidimus in lienis uero sinistram.

Quarto distantia animaduertēda est ne ad locum nimis uicinum reuocemus. At cum materia iam fluxerit utrūq; horum conducit, nempe quia ab ipso membro eam excipimus, aut

ad uicinam sociamq; particulam reuocamus, & ab illa eam extrahimus ueluti in affectibus uteri uenam malleoli (saphenam uocant) incidimus, eā uero quæ sub lingua ē in affectibus utriusq; tonsillæ, seu glandule gutturis quas duas amigdalas uocant.

At cū ad contrarium locū reuellere desideras primo qdem dolorem illius particulæ à qua retrahitur mitiga, animaduerteq; ne trāsitus fiat per membrum nobile.

Notitia preterea uirium mēbri tripliciter cōfert. Primo quidem inspicere oportet an nobile sit & princeps, nā in his nō debemus uti quoad fieri potest fortibus medicaminib⁹ qm̄ uniuersum lederemus corpus. Nec quod ex cerebro aut epate euacuare oportet haud q̄q̄ semel euacuabimus, neq; uehementer omnino infrigidabimus. Porro cū medicamina dissoluentia epati emplastris superimponere uelimus, nequaquā talia apponamus nisi admixtis secū astringētibus odoratis ut uirtus custodiat, itidē agendū est in his quæ potu ad id damus. Cor uero inter cetera membra maxime obseruandum quod ad hoc attinet mox cerebrum deinde epar.

Secundo membrū quod habet cōmune officiū animaduersione dignū est, etsi nō sit principale ut uentriculus & pulmo idcirco uentri

## CAPVT

culo existenti imbecilli in feb. uero non licet aqua ualde frigidam potu dare. Nec te latere uelim q̄ apponere super membra principalia & quæ eis uicina sunt medicamina exquisite mollientia magnum periculum uite afferat. Tertio sensus acumen eiusq; hebetudo haud quā negligenda est nam apponere medicamenta uitiose qualitatis & mordicantia atq; nocua ut elateria & id genus alia super membraneruea quæ sensus acumen habent cauendum. Tria adhuc sunt genera medicamentorum a quibus abstinēdū est nempe uel quæ dissolunt uel quæ extreme infrigidant uel quæ oppositas habēt qualitates ut erugo eris & cerusa & plumbū & es ustum & his similia hæc inq̄ est distinctio electionis medicamenti assumpti ex natura membri. Ad magnitudinē autem morbi reuertēdū est quicūq; igitur gratia exempli calorem morbosum sui corporis habuerit extingui quidē debet frigidiori medicamento. Si uero frigiditas accidentalis eius ualida fuerit calidiori medicamēto calefacere oportebit. q̄ si neutrum eorum ualidum fuerit sufficit nobis medicamentum minus ualidum.

Id uero quod ad tempus morbi attinet scire licet in quonam temporum morbus sit ut

exempli causa si abscessus fuerit in suo principio admouenda sunt quæ repellant tantum. Sed si in uigore suo constiterit. quæ tantum dissoluant: in medio autem istorum temporum permiscenda hæc sunt. Quod si morbus acutus inter initia fuerit tunc modice regimen attenuabimus.

In consistentia uero extreme uictus attenuandus est. At si morbus diuturnior fuerit tum tenui uictu initio non utemur. apud statum uero modico uictu uti licet: & si complures morbi diuturni: preter febres: uictu tenui soluantur. itidem cum materia egritudinis multa fuerit eiusque caliditas multa: tunc in principio euacuare conuenit: nec concoctionem expectabimus. quod si mediocris fuerit concoquere ac euacuare conueniet.

Indicia autem à rerum conuenientia seu similitudine sumpta: facile poteris cognoscere: ex quarum genere est aer. qui quidem maxime considerandus est curationi ne. an morbo uim afferat. Porro egritudines periculosa in quibus si debita utamur mora ac minoratio seu alleuiatione: nec adhuc simus in tuto de uirtutis deliquio: tunc primo a forti curatione incipere consentaneum esse dicimus: quod si nullum est in eis periculum. tunc sensim ad fortiorem



## CAPVT

ex apho. procedendū est: si leuior non suffecerit. Caue  
 ly. suu: præterea ne ab eo quod conuenit agere decli-  
 de yhuu: nes quamuis impressio tardauerit. ne persistas  
 origi. n. in errore aliquo & si eius nocumentū non ap-  
 paruerit: nihilominus non permaneas in uni-  
 co remedio in eadem curatione. Sed ad aliud  
 pertranseas. Quoniā corpus non afficitur à re  
 consueta. Quodlibet præterea corpus quodli-  
 betq; mēbruū imo idem corpus idemq; mē-  
 brū. in diuersis temporibus proprietatem ha-  
 bet. ut possit ab aliquo remedio affici ab ali-  
 quo uero nō. Cūq; ignoraueris morbū cōmit-  
 te eum naturæ: nec precipitanter agas: qm̄ uel ip-  
 sa natura morbum euincet: uel mōstrabit. Cæ-  
 terū ubi morbus coniunctus fuerit dolori aut  
 cause doloris uel inferenti dolorem. ut est uul-  
 nus uel casus. tūc à mitigātibus dolorē ichoā-  
 dum est. Et cum usu soporificorum idigueris:  
 ne pertranseas quale est papauer: cum hoc enī  
 quod soporificam uim habet. familiare est. q̄  
 si ex uehementi sensu membri ledatur. alatur  
 his quæ sanguinem multo crassiores reddūt.  
 ut frumentum coctum. At si infrigidationem  
 non uerearis. cibetur rebus frigidis ut est lactu-  
 ca & id genus alia.

Porro scias q̄ inter cætera remedia optimum  
 est recurrere ad id quod uires tum animales  
 tū uitales ualidas reddat. ut letitia & occurfus  
 rei grate

rei grate, & iugiter uti his quibus gaudio afficitur immo fortasse iuuabit assidua consuetudo cum uiris persistentiss. & cum his quos reueretur prohibet. n. ægrotum a rebus quæ nocent ei. Proximam autem huic generi remediorum est transferri de regione in regionem: & de aere in aerem: & de habitibus in alios habitus transmutari & omni uti conatu ut habitus atque motus exerceat quibus membrum æquetur aut alicui medicamento restituitur ut cum cogimus puerum strabum inspicere obliquæ in rem splendidam & qui habet torturam faciei inspicere speculum calibis. Sic. n. faciem suam æquare conabitur, atque oculos ita ut fortasse tali solertia reducetur ad correctionem.

Inter cætera propterea quantum poteris cauere debes, ne remediis uehementibus tempore non commodo ueluti ne magna solutione alui uel uomitu et abscessuum aptiōe et uisione, quam cauterium græci uocant, tempore æstatis et hiemis utaris. Id uero quod in curationibus eximia requirit considerationem est ubi in eodem morbo duo concurrunt quæ contraria exigant ut si gratia exempli ipsa egritudo aliquid exigit cuius contrarium tamen eius causa expetit ut est ipsa febris pituitosa. Hæc. n. ratione sui caloris refrigerationem ratione uero materię, quæ est causa febris calefactionem desiderat, et contra itidem ubi morbus calefactionem & eius accidens infrigidationem

## CAPVT

postulat ut materia doloris intestini coli quæ quidem calefacientia aut discutientia uel attenuantia exposcit uehemens tamē dolor eius refrigerantia & soporifera requirit & contra. Cæterum te latere non licet q̄ non q̄libet repletio neq; quelibet mala tēperatura curatur per contrarium, uidelicet per euacuationē & per cōtrariationē seu p̄ oppositā alterationē. Qm̄ sepissime usus optimi regiminis ad repletionē & malā tēperaturā adhibiti satis sufficit.

**E**ten quartæ caput secundum de medicatione egritudinum ex malo temperamento oritur.

**S**I mala tēperatura sine materia fuerit. tunc si ipsum temperamentum permutare tantū debemus, sed si cum materia fuerit euacuabimus quidē et fortasse sola euacuatio satis erit ubi nulla mala tēperatura ex ipsa materia ob eius p̄cedentem infixionem relicta fuerit fortasse tamen id non erit satis, ubi uitiōsa tēperatura relicta fuerit: imo peracta euacuatione temperamentū mutare oportebit. Ad hæc dicamus q̄ mala tēperatura uariis curatur morbis: nempe hæc uel erit iam infixa & tum eius cura fiet per cōtrariū absolute, & hæc est absoluta medicatio. uel erit in fieri quā quidē corrigit ipsa medicatio facta cum preservatione ut

gratia exempli absoluta medicatio est curare putredinem febris quartanæ medicamēto quod ex uiperis conficitur theriacē uocant & tertia nam potu aqua frigida, ut flaua extinguatur bilis. & precautio est ut in quartana ueratro in tertiana scamonio purges cum per id, principium futuræ accessionis uitare intendimus. Cumque de aliqua egritudine ambigis utrum eius causa fuerit caliditas uel frigiditas & cupis id experiri nequaquam expiaris re modum excedente: et aduerte ne impressio per accidens facta te decipiat. Scias quoque quod equale est tempus quo fit infrigidatio & calefactio. Verum maior est timor infrigidationis. quia calor est naturæ amicus in humectatione tamē & exiccatione æqualis est timor uerū ipsa hūectatio longius exposcit tempus. Humidum autē & siccū utrumque eorum conseruatur a sua ualidissima causa, permutatur uero a uehementi causa sui contrarii, et calidum quidē adaugeſ illis causis quarum mentio iam a nobis plene facta est. Deinceps quæ excrementa, & repletionem tollunt, & quæ obstructiones recludunt. Mox eo quod ipsum conseruat, quod quidem est humidum æquale: frigidum uero ualidius redditur ob eius ualidas causas: & ob caloris suffocationem & per id quod ipsum uehementer dissoluit quod quidē est ipsa siccitas per se & caliditas per accidens.

Qui cūq; aut exupantē calorē aperientibus re-  
 mediis curare uelit ab immodica infrigidatiōe  
 caueat ne in lapidescentem facultatē & opila-  
 tiōē addat ab immoderata quoq; calefactione  
 abstinere debet, qm̄ malā temperaturā calidā  
 adaugeret sed sensim pcedere debet, & pmo  
 his q̄ detergūt. Ad id quod infrigidari debet.  
 Si aqua ordeī & aqua endiuie sufficiat bene ē.  
 sed si id non satis sit tunc mediocria admini-  
 stranda sunt. Qd̄ si ne hęc quidem satifficiant  
 utēdū ē his quæ tenuē habēt calorē intrepide  
 q̄ id augere potes qm̄ maius est iuuamentum  
 infrigidationis, quod sequitur ex apertioe eo-  
 rum, q̄ nocumentum super calefactionis ipso-  
 rū: q̄ qdē facile poterit extigui post reclusionē.  
 Immoderata autem extinctio coctionē acriū  
 humorum uetat, etsi nōnulli huic aduersen-  
 tur snie cum ignorent imodicam extinctiōē  
 uires deicere & præsertim, quæ per egritudi-  
 nem imbecilliores effectæ sunt & quāuis ma-  
 teria summopere corrigatur quandoq; tamē  
 relinquuntur post eā egritudines quæ ex ma-  
 la temperatura frigida imateriali pendēt, aut  
 cum materia cōtraria illi tēperaturæ quæ cor-  
 recta fuit. Porro frigida tēperatura cū iam in-  
 fixa fuerit, uidetur quoquo modo esse diffici-  
 lis calefactionis, in principio uero ē ad modū  
 facile uerū infrigidare summe calidā, & si sit

difficile, facilius tamē est q̄ calefacere extreme frigidam. Qm̄ extrema frigiditas ē ipsa mors naturæ, eiq; æquatur.

Scias p̄terea q̄ infrigidatio qñq; adiūgitur siccitati & qñq; humiditati nōnūq; uero ē expers utriusq;. Exiccatio autē frigiditatē iā factā fouet humiditas uero eā quæ nunc fit magis inducit nōnūq; p̄terea adiuuant siccitatē oēs causæ caloris q̄ in extremo fuerint & nōnūq; oēs causæ imoderatæ frigiditatis humiditatē adiuuant, neq; quicq; adeo efficaciter id efficit ut ociū & assiduus usus leniū balneorū, & thermarum hoc aut totū iam in prioribus sermonibus notum fecimus uinum quoq; dilutum eximiam habet uim humectandi.

Scire adhuc debes q̄ cum senex indiget refrigeratione & humectatione, ad id nō est sufficiens id quod ad tēperie eū deducat imo quod ad eius frigidam & humidā tēperaturā in quā incidit transeat, & si sit ei accidentalis, est ueluti naturalis. Nec te lateat qd̄ sepiissime qñ aliquid quā temperaturā imutare cupimus cogimur facere, quæ eam ualidiorem reddant, mixta cum re ei contraria ut cum cogimur uti acetō cum medicamētis calefaciētibus ob eorū ibecillē uim pp̄ quā ad aliquā p̄ticulam penetrare nequnt itidem cogimur uti croco in medicamentis infrigidatibus cor, ut ad ipsum per

ducatur. Multotiens adhuc aliquod medicamen  
habet ualidissimam uim permutandi aliquā  
temperaturā: sed ob eius tenuitatem nō adeo  
immoratur ut suum peragat officiū tunc igif  
oportet ei admiscere aliquid quod illud cras  
sius reddat detineatq; & si contrariū sue actio  
nis id inferat, ut cum oleo balsamino cerā ad  
miscemus uel aliud ut in eo membro tātis per  
detineatur dum possit fungi officio suo.

¶ Caput tertium fen quarte. Quomodo &  
quando fieri debeat euacuatio.

**D**Ecem sunt ea quæ rectum, adferunt iudi  
cium de euacuatione faciēda, nempe re  
pletio, uires, temperatura, habitudines corpor  
ris, & accidentia concurrētia, uelut ne illi quē  
soluere uis acciderit iam solutio alui. Qm̄ in  
alui profluuiio aluū soluere periculosū est ad  
hæc ætates & tempus anni, & aeris cōstitutio,  
& regiōes & p̄suetudo in eūone, & exercitia  
seu artes. Hæc inq; si p̄trariū affirmādæ eua  
cuationis indicēt euacuationem quidē prohi  
bebunt. Vacuitas nāq; euacuationem oinnino  
prohibet Itidem & imbecillitas cuius uis triū  
facultatū. Verum quādoq; p̄eligimus debilita  
tem alicuius uirtutis, potius q̄ nocumentū qd̄  
sequi posset ex dimissione euacuationis: hoc  
autem in facultatibus sensus & motus, si confi  
damus rem periculosam corrigi posse cū acci



derit, itidem & in cunctis facultatibus fieri debet. Temperatura p̄terea calida & sicca euacuationē prohibet. itidē frigida & humida quæ caloris est expers uel imbecillē habet calorē euacuationē uetat. calida uero & humida eā satis admittit. Habitus autem corporis idem facit, nam immoderata macilentia et raritas corporis, eam impedit ob timorē dissolutionis uirtutis, & ideo cum rexeris aliquem imbecillū, macilentum, qui multā flauam bilem in sanguine habeat, debes ipsi ea exhibere remedia quæ urinam multiplicent & non euacuare ipsum, cibabiq; eum his quæ optimum sanguinem generant ad frigidum & humidum declinantia. Sic enim fortasse temperamentū humoris eius corriges. Immo forte roborabis ipsum & tunc euacuationes tolerabit itidem neq; sis p̄ceps in egro euacuādo qui ex usu habet parum comedere si euacuationem euitare potes. Et qui supra modum obesus prohibendus quoq; est ab euacuatione timentes tū ne frigiditas præualeat tū etiam ne caro uenas opprimat easq; inanitas claudat & suffocet natiuus calor. Aut ad uiscera excrementa exp̄mat. Accidētia quoq; mala ut prōptitudo ad alui p̄fluuiū (quod diariā uocat) & puulsio euacuationē uetat, & etates inferiores in egro incremento & quæ ad terminū ultimi senii deuenierit. Tps quoq; æstiuū & sup̄ modū

frigidum eam non admittunt. Regio ad hæc meridionalis admodū calida satis ei obstat, cū maior pars medicaminū soluentiū sint calida, cōiunctio aut duorū calorum intollerabilis ē. Adde etiā q̄ uires sunt imbecilles, & laxæ, & calor exterior trahit ad se humorē foras, in medicamentū uero intro, et sic ualidus accidet tractus qui ad pugā ducet. Septētrionalis quoq̄ regio frigida, eadē uetat & qui parū ē affuetus euacuari. ab euacuatione etiā prohibēdus est, Itidem & qui habēt exercitia in quibus magna fieri solet euacuatio ut qui balneis subministrant & qui onera ferunt & tandem in quolibet exercitio laborioso abstinendum est ab euacuatione.

Porro scire debes q̄ ex qualibet euacuatione quinque desiderantur, Primū quidē ut id quod euacuari debet euacuetur, post quā prorsus euacuationē alleuiatio subsequatur, nō lassitudo instrumentorum, aut caloris irritatio aut febricularia, i. ephemera, uel aliquis alius morbus qui subsequi solet ut intestinorū abrasio, per alui solutionē & ulcera uesice, per urinæ euacuationem, nam etsi id iuuerit eius iuuamentum non percipietur immo fortasse statim nocet donec accidēs remoueat. Scđo inspiciendū est quo tēdat: qm̄ nausea uomitu purgatur & dolor uētris p̄ alui deiectionē, Tertio ut origo

memברי sit in ea parte, ad quā uergit, sicut se habet interna uena dextri brachii ad iocinoris affectus, nō autem capitalis dextra quæ cephalica nūcupatur. Nam si in similibus errorem cōmiserit noxam afferet. Membrum autem p quod educitur ignobilius esse debet eo, a quo uacuatio fit ne humor ad nobilius tendat per exitumq; sibi naturalē id fieri debet, ut se habent membra urinaria ad gibbum epatis & intestina ad eius concauum. Præterea membrū per quod fit expulsio, quādoq; est ipsummet membrum a quo euacuatio facienda est. Sed si in eo fuerit aliquis diuturnus affectus uel alī qua recens egritudo timendumq; esset ne humores super ipsum transirent: tunc oportebit eos aliō deriuare quod sit conuenientius: imo quādoq; ueremur ne predominio hūoris in eo egritudinē pariat ut si ab oculo ad guttur repelleretur, fortasse enim in timorem angine nos ducet. Quo circa in similibus sensim pcedendum est: imo ipsa natura quādoq; simili fungitur officio & euacuat per insuetā partem, cum custodire curet illud membrum qñ est imbecille & aliquando id quod natura euacuat a remota oppositaq; parte ambiguitatē affert, ut si a capite ad aluum aut crus & plantā pedis, id expellat: nā utrū ab uniuerso membro aut ab aliquo ei9 sinu id fiat nō uere scit.

## CAPVT

Tempus euacuationis considerare oportet & 4  
 Gal.adhuc.d. q̄ in diuturnis morbis expectan  
 da est concoctio non in alijs. Quid autem sit  
 concoctio iam nosti. Post concoctionem autē  
 ante euacuationem exhibenda sunt attenuan  
 tia ueluti aqua hysopi aut satureie & semina.  
 Verum in acutis quoq; morbis & presertim  
 quietis consentaneum est coctionem expecta  
 re, Sed si mobiles fuerint tunc conuenientius  
 est euacuationem materie accelerare. Quoniā  
 lesio que ab eius motu prouenit longe maior  
 est q̄ quæ ab euacuatione ante concoctionem,  
 præcipue ubi humores fuerint tenues, & maxi  
 me si in capacitatibus uenarum fuerint, & nō  
 ingradientur membra, At si in aliqua particu  
 la humor fuerit detentus, haud quaq̄ mouea  
 tur donec concoctus fuerit & inediocrem sub  
 stantiam adeptus. ut ex locis propriis iam no  
 sti. Itidem si non fidamus uirtutem sustentari  
 usq; ad tempus concoctionis, euacuabimus  
 quidem eum humorem. prius tamen cognita  
 eius tenuitate & crassitie. Qd̄ si crassus & den  
 sus fuerit nequaq̄ eum moueas, nisi prius ip  
 sum attenuaueris. Indicat autem ipsam crassi  
 tudinem nausea quæ precessit, & dolor tensi  
 uus sub precordiis, & ortus apostematum in  
 uisceribus. Maxime autem animaduerten  
 dum est in hac re ne exigui meatus sint obstru

Et & post hæc omnia poteris aliu soluere ante concoctionem.

Quinto uero contemplanda est quantitas rei quæ euacuatur quod quidem ad considerationem quantitatis materie uirtutisq; atq; accidentium quæ post euacuationem remanent attinet. quoniam si accidens aliquod euacuationem sequatur minus euacuabimus de eo quod euacuare proposuimus nisi sperauerimus succurrere illi accidenti quod euacuationem subsequitur ut in conuulsione ex repletionem fieri solet.

Scias adhuc q̃ dupliciter materia euacuatur eradicaturq; a suo loco, uel enim per reuulsu ad cōtrariam remotamq; uel per deriuatu ad contrariam proximamq; particulam, Conuenientius tamen tempus quo id fieri debet, est dum nulla est in corpore repletio neq; humorum redundantia ullo pacto. Subiiciatur igitur ut a supremis partibus oris alicuius uiri immodice sanguis profluxerit uel ab hæmorroidibus alicuius mulieris, immoderata sanguinis copia effluxerit cogimur omnino aut ad partem uicinam oppositam reducendo. & tunc recte reuocabitur materia. in primo quidem exemplo ad nares, in secundo uero ad locos, menses reuocádo. At si ad remotam partē oppositam reuellere cupimus, tunc

in primo exemplo per infernas. In secūdo uero per supernas uenas & corporis particulas sanguinem euacuabimus & cum ad remotam partem sit auersio, non debet per duas diame-  
tros remoueri: sed tantum per unam diame-  
trū que longinquior sit: nam si materia in su-  
premis partibus dextri corporis fuerit nequa-  
quā ad infernas sinistri reuocabis, imo ad eius-  
dem dextri infernas partes retrahes quod pro-  
fecto cōueniētius est aut ad sinistras supremas  
si tāta fuerit distantia quāta inter flexuram &  
flexuram dūmodo res non sit ut in duabus ca-  
pitis partibus: nā si in dextra capitis parte ma-  
teria infederit ad infernam nō ad sinistram ca-  
pitis partē trahes. Cōterū cum ad locū remor-  
tū materiā reuellere intendis mitiga prius do-  
lorē loci affecti. sic enim minor fiet tractio-  
nis uiolentia, cum dolor ipse trahat, At cū gra-  
uiter trahitur ad locum, ad quem trahere cu-  
pis nō properes importune, fortasse enim hu-  
iusmodi urgens infestatio mouebit materiā,  
eamq; attenuabit & nō trahetur imo ad affe-  
ctum locum facilius reuocabitur. Nōnūq; prae-  
terea satis erit tibi retrahere. & si eā non euac-  
ues: quoniam ipsa retractio prohibet materi-  
am cōverti ad mēbrum quāuis non extrahat  
eam. Sola enim auersio ipsa fungitur officio  
proposito: etsi ea nihil euacues: immo suffici-

et tibi si usus fueris de uinctiōe oppositorum membrorum cucurbitularumq; defixiōe aut medicamento, que rubificantia uocant & ut sū matim dicam, quibusuis dolorem inferentibus remediis. Materie rursus quæ facilius uacuatur sunt quæ in uenis existunt mox que in membris, & artubus. Maxima nanq; cum difficultate ex his extrahi atq; euacuari possunt: nec fieri potest qn cum illis aliquid aliud euacuetur. Ad hæc qui euacuatus est non debet festinare ad cibos multos ac crudos capiendos quoniā natura eos incoctos trahet q; si aliqua ui cogimur id facere id quidem sensim ac paulatim fiat adeo ut ordinate res procedat & qd corpus ingreditur sit optime concoctum.

Porro uene sectio est humorum eque auctorum propria euacuatio. Sed propria euacuatio, quæ debetur humori sua quantitate tantū exuperāti aut sua q̄litate corrupto, est aliud a uene sectione. Omnis præterea euacuatio immoderata solet ut plurimum feb. inducere. Cūq; ex detentione alicuius fluxionis consueuerit, aliquis malus subsequatur affectus, eādē reuocare euacuationem, curatio ut plurimum ē ut si aurium sordis aut narium mucici detētio uertiginem induxerit, proculdubio eorū eductio eam tollent. Nec te lateat q; minus nocet relinquere aliquod residuum humoris, q; eua



## CAPVT

cuatioe indiget q̄ exquisite eum euacuare, uel  
 egrum eo perducere ut uires debilitetur quo  
 niam ipsa natura tale residuum sepissime sol  
 uere solet. Et ubi humor in genere perseuera  
 uerit conuenienti, egrotasq; eum bene fert ne  
 timeas exuperantiam, & fortasse eris coactus  
 euacuare usq; ad animi deliquium. Et si quis  
 uires ualidas habeat, materia tamen humorū  
 uiciosorum eius, admodum exuperans fuerit  
 uberrime euacuari potest. Sed qui uires imbe  
 cillas habet, humorumq; malorum eius ma  
 teria, multa fuerit, tunc sensim eum euacuare  
 oportet. Itidem si materia ualde hereat, aut  
 cum sanguine ualide mixta fuerit is semel eua  
 cuari nequit, ut fit in coxendice & in articulo  
 rum doloribus diuturnis, & cancro inuetera  
 taq; scabie diuturnisq; tuberculis. Scias præte  
 rea q̄ alui solutio trahit a partibus superiori  
 bus & eradicat ab inferioribus. Expedi igitur  
 utriq; tractui conuenienti uidelicet & opposi  
 to. cōuenit adhuc & post materierum quietē.  
 Et cum materie in superioribus partibus fue  
 rint, & ad oppositum trahit & a loco ubi sunt  
 eas euellit. Vomitus uero & attractionem &  
 euulsionem opposito modo efficit. uene se  
 ctio uero uarie se habet iuxta loci uarietatem  
 ubi sanguis existit, ut iam nosti. Ille præterea  
 minus euacuatione idiget qui optimo utitur

nutrimēto optimeq; concoquit & qui regio-  
nes inhabitant calidas.

¶ Caput quartum fen quartæ de regulis quæ  
uomitui & alui solutioni sunt cōmunes deq;  
modo quo uomitiuū solutiuumq; trahant.

*unde dicitur  
in lib. 7. de  
signa. cap.  
1. ubi in sa-  
nis dicitur  
legit.*  
**S**I qs alui solutione uel uomitu uti deside-  
rat debet suū dispartiri cibū, & quantum  
uno die sufficit ei, bis idē resumat uarietq; ci-  
baria potionesq;. fiet enī ex hoc ut uētriculus  
si qd in se cōtinet id susq; deq; expellere cupi-  
at. At si cibus nec uarius neq; sup aliū apposi-  
tus fuerit uētriculus pfecto eum tenaciter reti-  
net eūq; custodit uehemēterq; eū amplectit p-  
sertim si exigue fuerit q̄tītatis. Qui uero lenē  
habet aluū, nullū horū agere debet. Nec te la-  
teat qd q bono uti regimine nō cōtigit eū idi-  
gere uomitu uel alui solutiōe, uel aliis simi-  
libus. Nam bonum regimen aliquid aliud  
his leuius desiderat. Immo forte si quis dili-  
gens fuerit in hac re sufficiet ei deambulatio  
& frictio & balnea. Qd si eius corpus reple-  
tum fuerit pfecto huiusmodi uiri repletio:  
ut plurimum ex optimo humore erit: hoc est  
ex sanguine huic ergo uene sectio magis ne-  
cessaria est pro eius purgatione non alui so-  
lutio. Porro ubi necessitas nos cogit uenam

*hic nō  
sibi cōse-  
qa idem  
est uenæ  
purgare et in methochimia r purgatione utiq;  
terea est contra gal. 6. capitulum. ipse enim  
multo tempore phlebotomia dicitur pcedere quocūq;  
uicem p̄silio est utendum. et hoc magis rōnā  
conformi, in ualde aut frigidis parit̄ euacuā  
parit̄ incidit galenus.*

## CAP V T

missione inchoandū ē. hoc. n. est Hip. preceptū  
 ī lib. de morbis passim grassantibus & est pro/  
 fecto uerū. Itidem si cum sanguine: pituitosi  
 humores imixti fuerit quibus fortasse uene se/  
 ctio crassitiē & lentorem addiderit tunc ab al/  
 ni solutione inchoādum est, & ut summam  
 dicam, cum humores equales fuerit prepone  
 phlebotomiā deīde euacua. Sed si inequales.  
 euacua prius excrementum donec equentur,  
 deinde uenam incide. Ad hec ubi preponenda  
 est sanguinis missio & aliquis pharmacū pre/  
 miserit, paucis diebus expectare debet. At cui  
 recens uena secta fuerit, & euacuatiōe indigue  
 rit, exhibere ei pharmacum cōuenientius erit.  
 Multoties uero exhibere pharmacum, ubi ue/  
 ne sectio conueniret febrem una cum pertur/  
 batione introducit, quæ quidē si adhibitis re/  
 mediis sedatiuis, non sedetur, tunc non igno/  
 rabis fuisse necessariū pponē sāguis missione.  
 Nec requiritur quelibet euacuatio, ob immo/  
 deratam repletionem: immo quandoq; affe/  
 ctus magnitudo repletioq; secūdū qualitatem  
 non secundum quantitatem eam exposcit. Se/  
 pissime adhuc aliqua necessitas cogit euacua/  
 tione uti, & aliquid eam prohibet nulloq; alio  
 ingenio uti potest q̄ inedia & sōno atq; corre/  
 ctione tēperature quā repletio inducit. Cōte/  
 terum aliqua est euacuatio qua ī precautionē  
 utimur

utimur ut est illa qua indiget is qui podagra  
 & comitiali morbo uel aliis corripitur certo tpe  
 solet & presertim tēpore ueris. Tunc ergo an-  
 te illud tempus debet se preparare & euacua-  
 tione sue egritudini ppria uti, siue sanguinis  
 detractiōe siue pharmacia & fortasse admini-  
 stratio exiccantium exterius & exiccatiua me-  
 dicamina aliquo euacuatiōis officio fungunt  
 ut his qui aqua inter cutim laborant admini-  
 strari solēt. Nōnunq̃ p̃terea oportet te uti me-  
 dicamēto simili in qualitate humori euacuan-  
 do, ut scamonio cum flauā bilem euacuare co-  
 garis, tunc igit̃ ei admisceri debet id quod sua  
 qualitate ei obstat, & ut in solutiōe cōueniat,  
 uel quod nō phibeat eius solutionē ut sunt mi-  
 robalani malāq; tēperaturā si qua orta fuerit  
 ab eo post illud corrigat. Porro q̃ uiscerū seu  
 stomachi ac intestinorū a patibus laborāt mo-  
 leste ferunt solutionem & uomitū Qd̃ si hoc  
 indigeāt da eis lupulos & cartamū & aquā po-  
 lipodii & cassiam fistulā & his similia. Inquit  
 Hip. Macilentos & ad uomitū faciles purgan-  
 dos esse per uomitum. hoc aut̃ fiat estate uere  
 aut autūno non hyeme. Sed qui mediocriter  
 carnosus fuerit cōueniētius est eum per iferio-  
 ra purgare. Qd̃ si res urgeat ut uomitu eua-  
 cuemus ad estatē differre debemus. Cauē-  
 dumq; est ab eo nisi ubi magna urgeat necessi-

*superior h  
 ex libello  
 quos quā  
 ybas me  
 in fine  
 5. 49. ibi  
 mebas et  
 uimera  
 lins*

tas. Attenuatio præterea humoris quē euacua  
 re uolumus solutioni ac uomitui preponēda  
 est itidē & meatuum dilatatio reclusioq;. hoc  
 enim fidimus corpus nullū laborē esse passu//  
 rū. Cæterum scire debes q; assuescere naturam  
 ut reddat lenis & facilis ad id quod cupis uide  
 licet ad uētris solutionē, uel uomitū anteaq; ex  
 hibeat solutiū uel uomitiū ē regimē p̄spez.  
 Ad hæc uētris purgatio, atq; uomitus ubi gra  
 cilitas uētris adsit, difficilis quidē ac laborio//  
 sa & periculosa. Porro uomituum medica//  
 mētum efficit solutiū cū uentriculus ualidā  
 habuerit uim aut ubi post uehementē famē ex  
 hibitū fuerit, uel si ille cui exhibitū est solutus  
 sit, uel natura lenis aut ad uomitum insuetus  
 aut q; illud medicamentum sit grauis substan  
 tie, facile descendēs. Solutiū uero reddit uo  
 mitium ob stomachi imbecillitatē aut imo  
 deratā excrementi alui siccationē, aut q; medi  
 camētū id abominabile ē, aut q; illud sūpserit  
 nausea patiā. Cūq; aliquod solutiū medica  
 mētū nihil uel aliqd incoctū soluerit, humorē  
 soluēdū mouet & eū p; corpus dispgit corpo  
 riq; dominat & alii hūores in eum conuertū  
 tur: & talis humor in corpe multiplicatur. Est  
 p̄terea in corpe aliqs humor q; facile uomitui  
 cōsentit ut plurimū, sicut flaua bilis: aliqs uero  
 cum difficultate ut atra bilis, quidā utrūq; ha

bet ut pituita. Ad hæc febriēs alui purgatione  
potius q̃ uomitu uti debet, q̃ aut humorē ha-  
bet deorsum descēdētē ut q̃ lenitate intestino-  
rū, quā lienteria dicūt, laborat phibitus est ei  
uomitus. Porro inter cætera medicamina sol-  
uētia illud certe deterius ē quod tēpore solu-  
tiōis ex medicamētis maxime diuēsis constat  
qm̃ solutio pturbat: & primū anteq̃ secūdam  
soluet & forte primū substantiā secūdi soluet.  
Quicūq; præterea solutiōi alui uel uomitui se  
cōmittit cū purū habeat corpus ipossibile ē qn  
& capitis uertiginē uētrisq; tormina atq; inge-  
tudinē patiat, & qcqd euacuabit ab eo id pror-  
sus maxia cū difficultate purgabit. & ut unico  
uerbo dicā. Quotiescūq; solutiū medicamen-  
tū excremēta expurgat nullā cōseq̃ ipsū ptur-  
batio. Sed cū incepta pturbatio, id pfecto aliqd  
aliud q̃ excremētū euacuat. Cūq; hūor q̃ p uo-  
mitū uel aluū euacuādus ē, in aliū cōuertatur  
hūorē corp⁹ pfecto idicat eē expurgatū ex illo  
hūore, quē euacuare desideramus. Sed si i ab-  
rasionē & qd nigrū fetidū uertat tūc malo ē.  
Præterea ubi sōn⁹ post solutionē inualuerit si  
gnificat corp⁹ eē exacte purgatū p talē eūatio-  
nem, & contulisse. Nec te lateat q̃ si post solu-  
tionem uel uomitum. sitis inualuerit q̃ per //  
fectam ac exquisitam optimamq; purgatio-  
nem significat. Scias adhuc q̃ solutium

*vide Me-  
sum The-  
orematē  
q. cap. 6.*

medicamen soluit ui tractiua qua ipsummet  
 humorem trahit & fortasse trahit crassum hu  
 more: & tenuē relinquit, ut quod atram bilem  
 soluit efficere solet nec recte locutus est qui di  
 xit illud medicamen generare id quod trahit  
 uel q̄ tenuius primo trahat. Tametsi Gal. sen  
 tentia hæc sit absolute tñ. d. q̄ illud solutiuum  
 quod nullam habet beneficam uim si non sol  
 uerit, sed in nutrimentū conuertatur q̄ generat  
 humore quē trahit: sed hæc sentētia non ē om  
 nino probanda. Verum ut ex sentētia Gal. col  
 ligi potest uidetur ipse cēdere q̄ inter medica  
 mētū trahēs & humore tractū sit quedā simili  
 tudo in substātia, & ideo trahit: quæ quidem  
 sentētia nō uidetur ueritati cōformis, Nam si  
 tractio fieret per similitudinē ferrū certe ferrū  
 traheret quādo illi dominaretur & aurū itē  
 dē aurū attraheret ubi sua quātitate illi preua  
 leret. Verūtāmē huius inquisitionis finis ad ali  
 um q̄ ad medicū pertinet. Secundū adhuc est  
 q̄ attractio humorū quæ fit per potionē solu  
 tiui medicaminis uel uomitiui per easdem fit  
 uias, per quas pulsi fuerunt donec ad intestina  
 & uentriculum perueniāt, ibiq; natura mouer  
 tur ut foras propellat. Raro tamen accidit ut  
 per potionē solutiua, ascendant ad stomachū,  
 quod si ascēderint ad uomitū quidē euocabū  
 tur, duabusq; rarionibus non fit ascēsus ad sto



machū. Prima quia solutiū medicamentum cito penetrat ad intestina. Secūda uero q̄a tempore potionis pharmaci solutiui natura festinat expellere ex uenis mesaraicis nūcupatis, deorsum non sursum. est enim. id & p̄pinquius atq; facilius. Adde etiam q̄ subsequētia, ea q̄ precesserunt impellunt. hoc autē maxime mouet naturā ad expulsionē p̄ propinuiorē uia & si medicamen haberet uim tractiuam nō cōiunctam ipsi humori, tunc uis naturæ expultricis deberet magis preualere ī corpore sano, ac robusto. Accedit ad hoc quia medicamē trahit illū ad propriā uiam. At uomitiū medicamen cōtrario modo se habet: nā cū in uētriculo est inibi moratur & humorē trahit ad se ex intestinis, suaq; ui & resistentia naturali uirtuti dominatur. Scire adhuc debes q̄ maior attractio humorū quæ fit p̄ medicamentorū solutiū, est in uenis nisi ualde uicinum extiterit. tunc enim ex eo & in uenas & nō uenas humor trahitur ut in humoribus qui in pulmone sunt fieri solet. hi enim per uiciniorē uiam trahuntur ad uentriculum & intestina, quāuis nō permeant per uenas. Item scias q̄ sepiissime exiccatio quæ fit cum medicamentis exiccantibus est causa euacuationis humidorū, a corpore ut in aqua inter cutem fieri solet.

Al. lra  
attra-  
ctio p̄  
nares

**C**aput quintum fen quartæ sermo de purgatione & eius regulis.

**I**am antea nobis traditū ē oportere corpus ppare ad recipiēdum solutiū medicamen anteq̃ exhibeat amplificationē meatuū lenitio neq̃ alui & p̃sertim ī frigidis affectibus. & ut sū mati dicā. añ uētris solutionē lubricū facere ē optima regula in q̃ maxima fiducia hñda est p̃terq̃ in his q̃ admodū pati sunt ad alui fluxū. in his. n. nihil tale agendū est. qm̃ īmodici pfluuii piculū esset. Hōꝝ ergo solutio medicamine admiscendū est aliquod uomitiū, ne festinet descendere a uētriculo anteq̃ p̃ficiat officii suū. Immo eque in eo uis utriusq̃ medicaminis & solutiū agat suā actionē uomitiū q̃ suo fungat officio illi opposito. Cæterꝝ balbutiētes sunt fluxui uentris expositissimi ideo q̃ fortissimū medicamen solutiū nō ferūt & ut plurimū eorꝝ solutio puenit. ex fluxionibus capitis, piculosum p̃terea est sumere pharmacū solutiū manētibus siccis excremētis ī ītestinis. sed debent prius educi siue clysteri siue aliquo lenitio iure. uti ēt balneo ante solutiui pharmaci potionē p̃ aliquot dies ē ex p̃patis remediis, p̃sentaneis nisi aliqd̃ īpedierit. Sed īter balnea & pharmaci potionē exiguū debet īteresse īteruallū nec post pharmaci haustū, de Al. lra bet balneū īgredi: qm̃ materiam ad exteriora calorē

euocat. Conueniret tamen ubi alui fluxionē  
sistere curaremus. Sed hieme nihil incōuenit  
primā domū balnei īgredi ubi ei⁹ calor haud  
q̄q̄ possit trahere. sed lenire & ut uerbo dicā.  
Aer ubi uersat q̄ pharmacū sūpserit ad exiguā  
caliditatē declinare debet ne sudet neq; mole/  
stia afficiat. hoc. n. inter ea q̄ pparāt numerat.  
Itidē & frictio & inūctio ex oleo pparatiuū est  
remediū. At q̄ pharmaco non fuerit usus neq;  
īpm potauerit nequaq; debet medicus exhibe/  
re ei medicamina uehemēter soluētia. Qui ue/  
ro repletiōe tenent hūoribusq; glutinosis ac/  
tētiōe in p̄cordiis laborāt & q̄ in uiscerib⁹ in/  
flāmationē & opilationes habuerint nulla est  
eis exhibēda potio donec id leniētibus alimen/  
tis, balneo ocioq; & dimissiōe reꝝ quæ moue/  
ant & inflāment corrigat. Porro qui aquas sta/  
gnales bibunt ac lienosi fortia desiderāt phar/  
maca. Adhæc si qs ualidum hauserit pharma/  
cum satius erit post illud dormire anteaq; ope/  
retur: quoniam tunc melius suo fungetur of/  
ficio. Si uero debile id fuerit satius erit a sum/  
pto pharmaco non dormire: quoniam natu/  
ra medicamentum id concoquet. Sed cum  
pharmacum incipit operari utcunq; fuerit  
tutius est non superdormire neque debet mo/  
ueri super potionem pharmaci sed quiesce/  
re ut ipsum natura amplectatur agatque in

## CAPVT

ipsum: nā nisi in ipsum agat id in naturā non  
 aget. Odorare tamen debet quā nauseā pro  
 hibēt ut mētā & rutā & apium & citoniū Al. līa  
 & terrā lenniā rosacea aqua respersā deest  
 pauco addito aceto & si ob odorem pharma- apiū  
 ci rēnuat illud haurire claudat nares. Debet p̄  
 terea q̄ a medicamēto abhorret aliqd tarcon  
 (qđ pyrethrū a nōnullis esse credit) mandere  
 ut oris facultatē stupidā reddat. Quod si ue  
 reatur ne medicamētū euomat extrema deli  
 gere debet & post potū statim aliquod habens  
 astringēdi uim sumat. Cæterum his quādoq;  
 medici catapotia melle obuoluūt nōnūq; mel  
 le. Zuccharo decoctis, adeo ut indumēto quo  
 dā oblinantur. Est quoq; cōueniēs industria ea  
 cera liniri. Ex industria adhuc est implere os aq̄  
 uel aliquo alio deinde catapotia ut sūt deuora  
 re aut aliqua alia industria uti totumq; id ita  
 deglutiat ne a medicamine quis afficiatur. De  
 coctum aut debet tepidū potari. Catapotia ue  
 ro cū aqua tepida deglutire licet. Ad hęc qui  
 pharmacum haurit uētriculū atq; pedū plātas  
 calefacere debet & statim ipsum sumere. Sed  
 postquā animus quieuerit ambulet ac sensim  
 moueat qm̄ huiusmodi motus satis iuuat, pau  
 latimq; aquā calidā hauriat quātitatē ta  
 men quā nec medicamētū soluat neq; ipsum  
 educat eiusq; uim hebetet nisi ubi urgeat ne

cessitas fluxionem alui detinēde. Potu adhuc  
 aque calide euitamus lesionē pharmaci. Præ/  
 tera qui calidi tēperamenti est debilisq; consti/  
 tutionis & imbecillis uentriculi & uult phar/  
 macū sumere debet antea bibere quale ē aqua  
 ordeī uel uinum granatorū & ut summam  
 dicā, aliquod alimētū tenue facilis cōcoctiōis  
 uentriculo preponat. At si non ita se habuerit  
 satius est ut ieiunus pharmacū hauriat, Porro  
 qui estate soluitur in feb. incurrit. Et qui phar/  
 macū sūpsit n̄ debet comedere neq; bibere do  
 nec pharmacū suum perficiet officiū neq; post  
 eius solutionē dormire licet, nisi fluxum siste/  
 re uolet. Et si eius uenter non sustinuerit  
 inedia, eo quod biliosus sit facileq; ad eum/  
 bilis cōfluat: aut quia iā diu precautiōe inedia  
 usus fuerit tum debet exhiberi ei panis pauco  
 uino maceratus, post pharmacum, ante purga/  
 tionē. hoc enim fortasse adiuuabit pharmacū.  
 Nec anum aqua frigida: sed calida abluere de/  
 bet. Quidā dixerūt q̄ catapotia deuorāda sūt  
 cū aliquo decocto corū nature r̄ndente ueluti  
 catapotia q̄ flauā purgāt bilē deuorāda sūt cū  
 decocto sumiterre & que atram cum decocto  
 epithymi & filiculi & id genus aliis & quæ pi/  
 tuitā educūt cū decocto cētaurii. Cæterū cum  
 aliquod corpus siccum duram habēs carnem  
 aliquo forti medicamine euacuare uolueris ut

Al. lra  
 uomi  
 tu

Al. lra  
 calide  
 estate

## CAPVT

ueratro & id genus aliis ualida humectatione prius utendū est, cibus scilicet pinguibus. Tandē fortia medicamēta purgatiua magnū minitatur piculū ut est ueratrū corpori nāq; integro cōuulsionē adfert, plethorici uero corporis hūores motu periculoso cōmouet & simul ad intestina trahit quod nauseam excitat.

Cūq; maximū infert nocumētū ex potu alicuius lactarie herbe uenenosi generis. quæ tithymallia uocātur. ut est daphnoides. quā laureolā uocamus. uel pityusa. quā scebrā mauri appellāt id nocumētū. lac acetosū tollit astringitq;. Sepissime p̄terea medicamen dimittit odorē in uētriculo: ita ut uideat ipsūmet inibi remāsisse cui remedio qdē est farina ordeī tota ob eius deterfionē. nihil. n. iter oīa q̄ bibuntur melius est. Cūq; iā diu pharmacū sūptū fuerit, nec dū opari ceperit. tū si fieri pōt ut ipm euomat & nihil moueat fiat. Sed si aliqd obstet satius erit traicere aquā mulsā uel eius sy. aut aquā in q̄ nitrū sit dissolutū uel glandem supponat aut clysterē infundat. Cause autē impotentie pharmaci sunt uel meatuū angustia a sua formatione aut ob temperaturam aut ex morbi uicinitate nam qui resolutione quā paralytim uocāt & stupore attonito quē apoplexiā dicunt capiunt astrictos habent meatus quibus medicamina debent transire ad illorū hu-

Al. lra  
fatei9  
alle //  
uiatio

mores:& ideo illorum solutio ibecillior red/  
ditur. Porro duo medicamenta solutiua eodē  
die porrigere ut metu plenum ē ita alienum a  
ratione. Quodcūq; etiam pharmacum quod  
est proprium alicui humori si eum non inue/  
nerit perturbabit quidem & cum difficultate  
soluet idemq; efficiet si eum in suo contrario  
imersum iuenerit. Cæterum oē pharmacum  
soluit priō humorē sibi ppriū deinde cū q ma/  
gis exupat tenuiorq; est. itidē & reliquos iuxta  
hūc ordinē pter sanguinē quē qdē natura post  
ponit atq; custodit. Attraheī pterea hūorē di/  
stātē difficile est. adhuc si qs uereat ne a phar/  
maco hausto supueniat ei inquietudo, & nau/  
sea is qdē duobus aut tribus diebus ante phar/  
maci usum debet uomitum citare cū decocto  
radicule eiusq; esu neq; salis copia i eduliis uti  
debet q purgationē desiderat. Cæterq; sepiissime  
cum pharmacum nō soluit molestiā nauseam  
animi deliquit. tremorē cordis torminaq; ad/  
fert aut sudorē sepiusq; cogunt ipsum euome/  
re. Quandoq; tamen sufficit sumere quæ ha/  
bent uim astringēdi. Potus quoq; aquæ ordeī  
tollit eius lesionē detergitq; quicquid intesti/  
nis adheret:& qui frigide est temperature cu/  
ius hūoribus pituita pualet post pharmaci affū/  
ptionē eiusq; opationē sumerē debet nasturtiū  
aq; calā elotum cum oleo. at si calidi fuerit tē



## CAPVT.

peramenti sumat psyllium ex aqua frigida & oleo uiolaceo & zaccharo albissimo & Iulep Sed qui moderatā habet tēperaturā sumat semen lini & qui abrasionē intestinorū timet armenie glebam, quā lutū artmenum uocant ex uino granatorū sumat. Porro his enarratis a purgatione utendum est ni eam sistere uelis. Ceterum si febris quēpiam a pharmaci potione inuadit nihil melius aqua ordeacea. Syrupus uero acetosus intestina deradit, postponi ergo debet, in secūdū aut tertium diem donec intestina sibi restituta fuerint. Porro q purgatus est balnea debet ingredi die secunda qm si quid relictū fuerit ex humoribus id balnea dissoluunt. Quod si balneis oblectetur ac i delictis habeat. Indicio est q eum a residuo purgabūt itaq sine eum. Qd si scias eum nō oblectari illis sed potius molestari tū illinc eū auoces. Nec te lateat q qui uētriculum & intestina imbecillia habet, fortasse ab ipsis medicaminibus quibus uis purgādi inest, facultatē solutiua adipiscetur talisq affectus in eo perdurabit: ita ut multis remediis idigeat quo astrigatur. In senibus quoq metuēdum est de solutiuo & eius nocumētis. Præterea sciendum ē q bibere aquā fructuū post medicamina purgatiua febres pturbationēq inducit. Multoties etiā post purgationē ueneq sectionē rema-

Al. lra  
succū

net dolor in epate quē potus aque calide tol-  
lit. In ortu etiam canis atq; in frigoribus maxi-  
mis nō est purgationibus utēdū idcirco satius  
est uere uel autūno pharmacū sumere autum-  
nus tamen ei rei aptior est. Hyems autē est tem-  
pus quo nix in montes cadit. Ver autem estas  
subsequitur. Ideoq; non sumatur ī eo nisi qd  
tenue sed autūnus ē eq̃le tēpus. Semp aut nō ē  
assuescenda natura ad pharmaca quoties indi-  
get lenitione, qm̃ id in usum cōuerteretur &  
eius tādē exitus ad perniciē ducet. Pharmacū  
quoq; fortes uires dissoluit eiusq; tēperamen-  
tū habet siccū: post potionē autē debilis phar-  
maci parū mouendum est ne eius uis dissolua-  
tur. Inter medicamenta debilia benedicta nu-  
merande sunt uiolē & zaccharū & qui hyeme  
solutiuo medicamēto indiget uentū obseruet  
austrinum, estate uero septentrionalem. Aliq-  
tū huius cōtrariū aiūt. Sed id qdē distinguere  
oportet iuxta uarios morbos. Cūq; eger debili  
indiguerit solutiuo pharmaco & nihil illud  
opeſt neq; debet is moueri sed dimittēdus ē.  
Mltoties p̃terea uētris solutio morbū excitat Al. lra  
febrēq; p̃it cui rei fortasse uene sectio sat erit. mor//  
¶ Caput sextum quartæ fen de imodica alui b9 ex/  
purgatione & quādo retinenda sit. citat  
¶ Inter indicia quibus cognoscimus iam acce fluxū  
dere tempus quo alui purgatio sistenda sit uētris

est sitis. Quid si purgatio pſeueret & sitis nō eue-  
nerit nō ē cur timeas eā modū excedere. At si-  
tis nōnūq̃ accidit non pp̃ multā & imoderatā  
purgationē: sed pp̃ ipsum uētriculū, nā si cali-  
dus uel siccus fuerit uel utrūq; horū habuerit  
citissime sitiet. Itidē pp̃ ipsū pharmacū id fiet  
ut si fuerit calidū exustiuū. Itidē & ob ipsūmet  
hūorē si biliosus fuerit ut flaua bilis pp̃ huius-  
modi ergo causas nō mirum si sitis acceleret.  
Quēadmodū si cōtrarie his cause contingant  
nihil a rōne alienū erit ipsam sitim tardius se-  
offerre. At cū siti imoderatā purgationēq; nō  
modicā tideris tū oīno reprime eā pſertim si  
nulla causarum uelocis ac cite sitis adfuerit. In  
hmōi. n. cū sitis appareat, haud quāq; differen-  
dū ē. Et forte id qđ expurgabit, rēpus quo pur-  
gatio abscindenda sit tibi indicabit, nā ubi ex  
flaue bilis purgatiuo iā purgationē deuenisse  
ad pituitā pſpicuum fuerit: tunc excessum fe-  
cisse notabis. Maxime uero si ad atre bilis pur-  
gationē res puenerit. Sāguinis aut soluti ma-  
ximi periculi maximiq; momēti est. Cæterū si  
alicui tormina in uētre relicta fuerint recurrē-  
dū ē ad id qđ ī tractatiōe de torminib⁹ dictū ē.

¶ Caput. 7. sen q̃rte. Quo nā pacto corrigēd⁹  
sit affectus illi⁹ cui⁹ purgatio modū excessit.

P Vrgatio quidem redditur immodica uel  
ob uenarū imbecillitatem aut q̃ earū ora

referata sint uſ ppea qđ purgatiuū pharmacū  
 ora earū mordet uel qđ corp⁹ ex eo malā acqſi  
 uit tptaturā: & ſic de aliis id genus. Si igit alui  
 purgatio imodica fuerit tū ſurſū & deorſū ex  
 trēa diligēda ſūt īcipiēdo ab aſcellis & īguinib⁹  
 & deſcēdēdo īferi⁹ ab eis exhibēdūq; ē parū me  
 dicamenti quod ex uiperis cōſtat theriacā uo  
 cant. & philonium. & ſudorē prouoca ſi fieri  
 poteſt ſiue balneo ſiue uapore aque calide ſub  
 eius pānis e qbus caput extollat & ſi ſudor ad  
 modū exupauerit, ppia ei q ſtipāt. Deterganē  
 aut aut fricent reb⁹ aſtrictiua uim hñtib⁹ ad  
 hibeāturq; ex aqſ odorate madefactiōes ut ſūt  
 īfuſiones odorate & ſandali & cāphora & ſuc  
 cus fructuū: partesq; exteriores fricare atq; ca  
 lefacere oportet. Immo ſi op⁹ ſit cucurbitule  
 ignite cū ſcalpellatiōe ſub coſtis ac īter hūme  
 ros adhibēde & ſi neceſſū fuerit emplaſtq; ex fa  
 rina ordeī toſti ac aſtrigētes aqſ uētriculo & ui  
 ſcerib⁹ ſupīponas, itidē & olea aſtrigētia ut me  
 linū & maſtichinū. Aer quoq; frigidus euitād⁹  
 ē. cōprimīt. n. ac aluū ſoluit. a calido ēt aere ab  
 ſtinendum. quia uires exoluit & odoramentis  
 fragrātibus hī confortandi ſunt, ſtypticaq; de  
 glutiat: panē quoq; exiccatū. quē arabes chah/  
 chah. nos biſcoctū uocam⁹ uio arōatico deuo  
 rēt ſitq; tale calidū & q iā antea ſupſerit panē  
 ex uio granatorū & gñā cibariorū ex faria ordeī

## CAPVT

torrefacti cōfectorum & cortices papaueris cō-  
 tritas. Experiētia quoq; cōprobatū est summo  
 pere ualere semen nasturtii trium drachmarū  
 pondere quod prius torrefiat mox lacte aceto  
 so subagitata. Dog ab arabibus dicto coqua-  
 tur donec coaguletur deinde potu detur. Ci-  
 bus præterea debet uim astringendi habere &  
 niue refrigerari uelut est uinum, succus uuarū  
 acerbarum & id genus alia. Ad retinendas etiā  
 alui fluxiones multū ualet uomitū aqua cali-  
 da excitare extremaq; in ea ponere. Quod si  
 gratia exēpli animi deliquio corripiantur, p-  
 pina eis uinū & si id totum nihil proderit tā-  
 dem poteris uti his quæ uim obtinēt soporifi-  
 cā & quæ sunt ualentissima remedia in tracta-  
 tione de sistenda aluo cognita. Medicus ad-  
 huc debet apud se paratos tum pastillos ac pul-  
 ueres stringētes deglutiendos. tum etiā clyster-  
 res ac eorum instrumenta.

¶ Caput octauū sen quartæ. Si quis pharma-  
 cū solutiū sumpserit & non soluerit.

**C**um purgatiū medicamētū non purga-  
 uerit torminaq; ac inq̄tudinē capitisq;  
 dolorē uertiginē p̄adiculatiōes, oscitatiōes ue-  
 intulerit recurrendū est ad clysterem ac glan-  
 des notas, bibatq; e mastiche tres drachmas ex  
 aqua tepida. & fortasse iuuabit pharmaci ope-  
 rationem astringentium potus uesciq; postea  
 citoniis

citoniis ac malis ut quæ & os uētriculi & quod infra est cōprimere ualeant nauseamq; sistāt, & purgatiui pharmaci motū qui sursum ferē deorsum reuocēt naturamq; roborēt. At si nihil clyster iuuerit malaq; accidentia orta fuerint ut corporis tētio, oculi pēminētia, motus quoq; superiora petat: tūc haud quāq; poteris uene sectionē euitare. Quod si nec pharmacū purgationē fecerit maliq; casus subsequuti fuerint, incidere quoq; uenā postea par ē, immo etiā post duos aut tres dies, nā nisi id fiat timēdum erit ne humores ad aliquas principes partes se conuertant.

¶ Caput nonum sen quartæ. De medicamentis quibus purgandi uis inest.

**Q**uædā sunt solutiua medicamēta quæ admodum uiciosa sūt, ut helleborus & genus tripolii (quod turbit uocant) p̄sertim quod uitiosum ē & genere croceum itidem & agaricū nō albū neq; purum sed ad nigredinē decliue: & sicut daphnoides (laureola dicunt.) hæc enim uitiosa sunt: & si quid horum sumat, mala inde sequuntur accidentia. cōsentaneum igitur est a corpore quātum possibile fuerit, uomitu aut aluo expelli & medicamētū quod ex uiperis cōstat (theriacē uocāt) remedio exhiberi, & multoties potio aquæ frigidæ, sedereq; in ea pharmaci malitiā pellit,

## CAPVT

uetatq; anhelitū ab eo corrūpi, q̄ oīa ex turbit  
 citrino & putrido inferri solēt. ad idē ualet q̄  
 quid acedinē sua glutinositate & lenificatio-  
 ne atq; pinguedine infringit. nōnūq; præterea  
 adest quædā pportio iter medicamēta & qdā  
 singularia tēperamēta ut scamonium qđ qui-  
 dē in his qui in regionibus degunt frigidis, ni-  
 si in magna quātitate sumat̄ exiguam efficit  
 operationē ut in regione germanorū. Cæterū  
 in aliquibus corporibus atq; regionibus fortasse  
 nō oportebit substātiā medicamentorū exhi-  
 bere sed eorū uirtutē. Porro medicamentis  
 purgatiuis cōueniēs est adhiberi medicamēta  
 odora ut p̄ hæc mēbrorū uires seruētur ad qđ  
 negotiū medicamēta cordialia optime ualet,  
 cū uitalē spiritū in omni mēbro confortent &  
 maior pars horū sua tenuitate & penetratiōe  
 ad id cōferunt; & quādoq; cōiungunt̄ duo me-  
 dicamēta quorū alterū cito alterū uero tarde  
 purgat suum humorē, primumq; cum suā cō-  
 pleuerit operationē, iam secūdū ad suū humo-  
 rē ui quadā impulit ac in ipsū egit & eius uim  
 hebetauit adeo ut cū secundum postea suum  
 agit opus, obtusi plane uigoris sit mouens &  
 nō perficiēs. Admiscendū igitur est illi aliquid  
 quod eius uim icitet festinareq; illud faciat ut  
 zinziber mixta tripolio (turbit uocat) efficere  
 solet, nō sinit enim illud longo torpere tēpo-



re, itidē efficit si ea exacte cōmisceas. Contem-  
plari autē debes eas regulas quas de uirib⁹ me-  
dicaminū simpliciū uim purgatiuā habentiū  
exposuimus ubi de uniuersalibus regulis sim-  
pliciū medicamētorū sermonē egimus. Medi-  
camen adhuc purgatiuū quādoq; sua pprieta-  
te digerēdo ut turbit qñq; cōprimendo soluit  
ut myrobalanus, nōnūq; tñ lenitione ut genus  
aerei mellis (qđ arabes siracost uocat) qñq; lu-  
brica opatiōe soluit ut succus pulicaris herbe  
q̄ psylliō uocat & prūa. Maior aut ps pharma-  
corum fortiū habet qđ uenenose facultatis &  
purgat donec uim inferat nature, iccirco corri-  
gi debent iis quæ pellēdi uenena facultatē ha-  
bēt. q̄ theriacalia ī media uocat. Nōnūq; uero  
amaritudo acredo astrictio acrimoniaq; medi-  
camēti (quā pōticitatē appellāt) atq; ei⁹ aceto-  
fitas actionē pharmaci adiuuant p̄sertim si cū  
ei⁹ pprietate cōueniāt, nā amaritudo & acredo  
ad digestionē, acrimonia uero ad exp̄ssionē &  
acetosa facultas ad ic̄sionē: q̄ ad lubricū reddē-  
dū p̄parat. Nec debēt simul cōiūgi cū cōp̄ssiuīs  
q̄ lubricēt æqs portiōib⁹: ita ut eorū uires inter-  
se æqles sint: imo aliud alio tardius opari de-  
bet: ita ut grā exēpli illud medicamē agat suā  
opationē añq̄ exp̄ssiuū mox exp̄ssiuū supueni-  
at & purget qđ lenitiuū leniuit: & seruata hac  
ratione in reliquis idem fiat.

## CAPVT

**¶** Caput decimum sen quartæ. Quidnā hac de re alibi querendum sit.

**I**N cōmētario nostro de medicamētōrū cōpositiōe (quē acrabadin inscripsimus) q̄rēda sunt medicamēta tum purgatiua tum etiā lenitiua siue epota siue inūcta & id genus alia, ac illorum ætates in tractatione uero de simplicium medicaminū materia, quærēda ē correctio cuiuslibet simplicis medicamēti & quo pacto eius defectui succurrendum sit ac qualiter potu exhibendum sit. Catapotia quoq; anteq̄ lapidis duritiē siccitate cōtrahāt deuorari debēt. Neq; ea dū recētia molliaq; sūt ita ut he reāt & lēto re suo cōglutinētur deglutire licet sed cum deficcari incipient & digitis cedunt.

**¶** Caput undecimū sen quartæ. De uomitu.

**Q**ui propter suā naturā minus ad uomitū duci debent sunt quidem oēs q̄ angustum thoracē uiciosamq; respirationem habēt, sanguineoq; sreatui parati, & quicūq; collū obtinēt gracile & quorū guttur abscessibus facile corripitur uentriculūq; ibecillū habēt atq; admodum obesi. his enim alui purgatio debētur. Macilētis uero uomitus magis conuenit ob eorū biliosam naturā. Qui uero ob cōsuetudinem uomitum euitare debent sunt quotquot uomitum moleste ferūt uel insueti, nam si ualidis uomitiuis medicamētis iū

euomuerint occissime uene mēbrorum respū  
rationis scindētur & in phtisim corruent. At si  
res fuerit ambigua fiat periculum leuibus uo  
mitiuis & si facile fert poterit deinceps fortio  
ribus uti uelut ueratro & id genus aliis. Verū  
si aliquis cui uomitus plane prohibetur ipsum  
euitare nō possit is pparandus & ad consuetu  
dinē ducendus est, alimenta lenia atq; pingua  
& fluida ei exhibēda sūt & a deābulatiōibus qe  
scere debet: & postea uomitus fiat pguiaq; ac  
oleaginosā cū uino bibat & añ uomitū optima  
edulia comedat presertim si cum difficultate  
euomat nā fortasse nō euomet. natura id recu  
sante quod qdem melius est bono q̄ malo ci  
bo adhibito, cūq; post cibū quem pro uomitu  
futuro assumpsit euomuerit comedere differ  
rat donec fames increuerit sitimq; mitiget uel  
ut cum syrupo de pomis sine aqua & absq; iu  
lep, & syrupo acetoso. hæc enim nauseam inci  
tāt, cibus quoq; qui ei debetur est pullus galli  
naceus pparat⁹ cū iusculo (quod arabes adra  
bagi nomināt) & postea bibat tres ciatos. Qui  
cūq; aut acida pter cōsuetudinem euomuerit  
in pulsu quoq; aliqd febris apparuerit differ  
re debet cibum usq; ad meridiem antea tamē  
aquā rosaceā calidam bibat. qui uero atram  
bilem euomuerit spongia aceto calido made  
facta uentriculo superponenda est. Cibus  
d iiii

## CAPVT

præterea eius q̄ uomitū facere decreuit debet  
 eē uarius: qm̄ si unicus tantū fuerit cib⁹ fortas  
 se uētriculus eū amplectet & recusabit reddeſ:  
 post uomitū adhuc humectatiuū satius erit co  
 me dere auūculus & colūborū pullos uolantiū  
 nō tñ ossa extremorū eorū. grauiā. n. sūt, ac tar  
 de ea uētriculus cōcoquit. Ad balneas quoq; se  
 trāsſerre debēt. Cūq; uomitiuū medicamētum  
 biberint currere ac deābulare laborare ue de  
 bēt mox euomāt idq; in meridie. Añ uero uo/  
 mitū debet oculos linamētis adhibitis ligare  
 uētrēq; ualde leniter fascia obuoluere. Et q̄ ad  
 uomitū parāt sūt eruca radícula q̄ estur & edu  
 liū ex pasta confectū qđ itria uocat & origanū  
 mōtanū recēs & cepa & porrū & aq̄ ordeī cum  
 suo sedimēto & melle & eduliū ex faba contra  
 cta cōfectū uinumq; dulce amigdale quoq; ex  
 melle & id gen⁹ alia & repletio ex pane azimo  
 oleo p̄pato & melones & cucumeres eorūq;  
 semina aut aliqd ex eorū radicibus aq̄ macera  
 tis cōtusis & suo modo dulcoratis itidē & her  
 modactylus. Ille aut q̄ uinū ut euomat biberit  
 nō debet post paucā eius q̄titatē sed post mul  
 tā id facere. Zyth⁹ quoq; (qđ phoca arabes uo  
 cāt) si ex melle post balnea bibat uomitū atq;  
 aluū mouebit. Ad hæc uomitur⁹ n̄ debet añ uo  
 mitū fortiter māderē q̄ cōedit. Cæterę q̄ ualidū  
 medicamētū uomitiuū bibere cupit ut ueratę

illud ieiunus bibat nisi aliquid obftet trāfactis  
duabus horis diei reddito prius alui excremē/  
to quod si pēna uomuerit bene ē, sin uero ali/  
quātis per laboret & si id satis n̄ sit balneū īgre/  
diat: & pēna qua uomitū irritat debet oleo cy/  
peri (arabes alcānā dicūt) pungi & si exagita/  
tio atq; molestia inferat bibat aquā calidā &  
oleū oliuay siue soluat siue non. Ad id quoq;  
cōducit calefacere uētriculū & extremas ptes.  
nauseā.n.inducit. Cūq; uomitiuū medicamen/  
tū iusto citius opari cepit q euomit qescere de/  
bet, optimaq; odoramēta olfacere extremaq;  
malesfacere, & aliqd aceti bibere, & mala atq;  
citonia cū pauco mastiche sumat. Nec te late/  
at motū magis, quietē uero minus uomitū in/  
ducere. Estas pterea ad uomitū tēpus est maxi/  
me accōmodatū, p̄inde si qs corp̄is naturalem  
habitū ad uomitū minime pp̄esum habeat, eo  
tñ indiget estate tutius ei cōcedi. Remotior  
quoq; terminus a quo uomitus fit, quoad pri/  
mā expurgationē est uentriculus etiā sine in/  
testinis. Sed quoad secundā purgationē fit a ca/  
pite & reliquis partibus corporis. Attractio ue/  
ro & exquisita eradicatio ab infernis fit parti/  
bus. Vtilem autem uomitū ab inutili discer/  
nes si eum alleuiatio excipiat & optima appe/  
tētia atq; respiratio, pulsus optimus, itidem &  
alie uirtutes respondeant & qđ a nausea initiū  
d iiii

## CAPVT

sumpsit. Solet autem magis uomitus offende  
 re: quē uētriculi morsus uehemēs comitatur  
 & exustio si medicamētum fuerit ualidum ut  
 ueratrū quod cū sumitur, incipit primo efflue  
 re saliuā, deinde subsequitur eā uomitus multe  
 pituite & excretionēs, postea uomitus fluēs ut  
 sputum. morsus autem atq; dolor manēt, ne  
 q; in alios casus permutātur p̄ter ipsam nause  
 am & eius molestiā, fortasse tamen uēter sol  
 uet, mox hora quarta incipiet quiescere, & ad  
 regem uergere. Vitiosum autem illud est. ubi  
 uomitus nō paret, molestiaq; augeatur, tentio  
 quoq; ac oculorū prominētia, & eorum uehe  
 mēs rubor sudor exuperās uox intercepta, nā  
 si quis his afficiatur & non succurrat ei ad in  
 teritum deueniet. Corrigitur autem id clysteri  
 & potu aquæ mulsæ atq; tepide aquæ, & oleo  
 rū antidoti uim obtinētiū ut est oleū de lilio,  
 & conetur ut uomitus prouocetur, qm̄ si euo  
 muerit non suffocabit. ad clysterem aut apud  
 te p̄paratū cōuerti debes. Porro uomitus ma  
 xime ualet in diuturnis morbis ut est aqua in  
 ter cus & morbus comitialis & atra bilis & le  
 pra, podagra & coxēdix. At licet uomitus mul  
 ta adferat iuuamēta, morbos tamē nōnūq; pa  
 rere solet ut audit⁹ grauitatē. Nec uene sectio  
 uomitui cōiungenda est, sed in tertium diem  
 differenda, p̄sertim si in ore uentriculi hu

mor affuerit. Multotiens p̄terea uomitus red-  
ditur difficilis, ob humoris tenuitatē quo fit  
ut crassior reddendus sit sumendo farinā gra-  
norū mali punici tosti. Scire adhuc debes q̄ si  
post uomitū excernatur p̄ aluum corruptum  
excremētum, significatur nauseatiuā satietatē  
expulsam fuisse deorsum. Vomitus autē post  
alui deiectionē significat ex alui accidētibus id  
fieri, & cōmodius tēpus ad uomitū ē estas p̄p̄ Al. līa  
eius raritatem. Valet p̄terea uomitus ad mem meri /  
brorū soporē. nocet tñ oculis. Pregnantē quo dies  
q̄ mulierē ad uomitum ne ducas, nā excremē  
ta corporis ipsius nō expelluntur per eum. uo  
mitus autē ac labor eam in perturbationē du-  
cunt, ideo sistatur. Quibuscūq̄ uero aliis uo-  
mitus acciderit opitulandum est.

¶ Caput duodecimum fen quartæ quid a uo-  
mitu agendum.

**C**Vm uomitū quis peregerit, faciem ac os  
aceto aqua temperato abluere debet ut  
grauedo quæ forte capiti illata ē remoueatur  
& de mastiche aliqd deuoret ex uino malorū,  
& cibum ac aquæ potū euitet, quiescereq̄ p̄se-  
ueret & partes precordiorum inungat, balne-  
um quoq̄ ingrediatur ac cito se lauet & egre-  
diatur ab eo. Qd̄ si a cibo abstinere non possit  
comedat aliquid delectabile bone substantiæ  
facilis concoctionis.



## CAP V T

**C**aput. 13. fen qrtz. De uomitus iuuamētis  
**I**vbet Hip. singulo quoq; mēse uomitū fieri  
 duobus diebus continuis: ut secūdo die sup  
 pleat id qđ pria defecit aut difficile fuit & ut  
 id qđ ad uētriculū tractū fuit egrediaf, pollice  
 tur. n. Hip. hac rōne sanitatē cōseruari. Sed ma  
 lū ē eū crebri⁹ repetere. Hmōi p̄terea uomitus  
 pituitā ac flauā bilē eūat uētriculūq; expurgat  
 nihil. n. aliud uētriculū nā purgat, ut fit ī inter  
 stinis quæ qđē a flaua bile ad ea effusa purgāt  
 remouetq; graue dinē capiti euenientē uisūq;  
 acuit, nauseatiuā satietatē pellit, & illi ī cuius  
 uētriculū bilis quæ cibū corrūpit effundit opī  
 tulatur, nā precedēte uomitu cibus repurgatū  
 stomachū reperit phibebūtq; uentriculum ab  
 abominatione rei pinguis, uereq; appetētie de  
 iectionem tollet, & ne acuta & acida atq; acria  
 desideret, & cōfert lassitudini corporis ac ulce  
 ribus renū & uesice est quoq; p̄sentaneū reme  
 diū morbo elephāti & uitioso colori morboq;  
 comitiali a uētriculo puenienti morbo ue rer  
 gio ac orthopnee tremori ac resolutioni estq;  
 remediū efficacissimū illis q; ipetigie laborāt.  
 Debet aut semel aut bis ī mēse postrepletionē  
 mīstrari, nō obfuato aliquo statuto circuitu,  
 neq; nūero dierū certarū. Vomitus deniq; ma  
 gis ei conuenit qui natiuo temperamento bi  
 liosus ac macilentus est.

¶ Caput. 14. sen quartæ. De nocumentis uomitus qui modum excedit.

**S**I uomit⁹ modū excedat pcul dubio nocet bit uetriculo eūq; debilitabit atq; dissoluet & ut materie ad eū tēdāt ppēsiore reddet, thoraci quoq; ac uisui, dētib⁹, dolorib⁹ capitis diuturnis nisi p uetriculi cōicationē id fiat satis officiet. Sed & morbo cōitiali q ex capite fit nocet, & nō pp iferna mēbra. Immodicus quoq; uomit⁹ epar pulmonē uisūq; ledit, & forte aliquas scindet uenas. sūt tñ nōnulli q cito repleti cupiūt, & cū nō possūt id ferre ad uomitū se cōuertūt. qđ qđc negociū i pessimas egritudines diuturnas eos ducet. Debēt igitur repletio nem cauere cibumq; ac potum equare.

¶ Caput. 15. sen quartæ quonam pacto puidē dū sit casibus qui uomētī accidere solent.


**Q**Uæ uomitū phibēt abūde a nobis dicta sūt tētiōi uero ac dolori sub pcor diis eueniētib⁹ satis cōfert calefacere ea fomētis aq calide inadidis adhibitis, oleisq; leniētib⁹: cucurbitulisq; ignitis. Morsum uero ualidū q i uetriculo relictus ē tollit pot⁹ iuris pīguis facilis pcoctiōis locūq; oleo uiolaceo i ungere admixto oleo ex uiolis luteis seu albis q cheiri ab arabib⁹ nūcupat pfecto ex pauca cera. Sz si singlt⁹ accidat & p seueret sternutatiōe ac cala aq sēsīm hausta mitigat d sāguis uero

Al. lra  
mo/  
uent

uomitū, iam in sermone nocumētorū uomitū  
 egimus. Tētionī uero (quā tetanū uocant) ac  
 morbis frigidis ac sopori uociq; intercepte q̄  
 uomitū subsequi solet succurritur extremorū  
 deuictione atq; forti frictione uētriculiq; cale  
 factione ex oleo oliuarū in quo decocta sit ru  
 ra & cucumeres siluestres (qui elateriū dicit)  
 & potu aquæ mulsæ ex aqua calida quo reme  
 dio utatur ille qui sopore correptus est in eius  
 q; aures immittatur.

Caput. 16. sen quartæ quid agēdum ubi uo  
 mitus modum excesserit.

**I**S dormire debet omniq; industria sōnus cō  
 ciliandus est, extremaq; deuinciēda sunt ut  
 in aluo sistenda facimus, uentriculo quoq; re  
 medio est ad mouere emplastra uim astringē  
 di habentia, confortātia. At si uomitus immo  
 dicus fuerit, & adeo expulerit ut sanguis eua  
 cuetur, tunc potu lactis ex uino mixti, quattu  
 or cotylarum quātitate (seu sextariorū) id p  
 hibeatur, nā hoc lesionē medicamenti uomi  
 torii hebetat sanguinēq; prohibet ac aluū mol  
 lit. Quod si p̄terea partes thoracis & uentri  
 culi a sanguine expurgare cupieris ne coagule  
 tur, syrupum acetosum niue infrigidatum sen  
 sim ei propinabis. Et aliquando ad id ualet po  
 tus succi portulace ex gleba armena. Ad si me  
 dicamen quod excrementa uentriculi per uo

mitum euacuauit, modum excessisse metuis   
alio loco petēda sunt remedia. Vomitoria uero  
medicamenta iuxta suos ordines & quo pacto  
quodlibet eorū propinari debeat, & prefer  
tim helleborus ex cōmentariis de compositio  
ne medicamentorum ac de materia simpliciu  
medicaminum petendum est.

**C**aput. 17. fen quartæ. De clysteri.

**C**lyster quidē est prestātissimū remediū  
excrementis euocandis ab ipsis intestinis  
ac ad mitigandos dolores renū & uesice eorū  
q; apostemata, & ad egritudines intestini coli,  
ac ad trahenda excrementa a mēbris principi  
bus supremis. Verum acres clysteres epar debi  
litāt febrimq; pariūt ualent præterea clysteres  
ad discutiendas reliquias quæ post euacuatio  
nes relinquuntur. forma uero clysteris & quo  
pacto fieri debeat iam in tractatiōe de dolore  
colico nobis explicatum est. Melior autē situs  
quo uti possit qui clysterem recipit est ut supi  
nus iaceat deinde supra partem doloris accu  
bat. Tempus uero cōmodius est quādo aer fri  
gidior existit, uidelicet anteq̃ grauedo mole  
stia perturbatio ac animi deliquium iualescat.  
balnei autē natura est humores excitare eosq;  
dissipare. Clysteris uero eos trahere qui reten  
ti sunt iccirco ut plurimum non iuuat præpo  
nere balneum clysteri. Et si quis intestina ha

## CAPVT

buerit uulnerata indigeat tñ clysteri siue pp febrē siue ob aliā egritudinē & timeat ne clyster retineatur, is pcul dubio debet sedem ac umbilicum aliasq; partes circumstantes milio calido calefacere.

**¶** Caput. 18. De linimentis.

**I**Nter remedia quæ essentiā morbi attingūt est linimētū. quādoq; autē medicamentum ipsū geminas obtinet uires. tenuē uidelicet ac crassam. uerū quæ tenuis est magis desiderat q̄ crassa. Qñ si crassities eius tenuitati equeat cū fiet emplastrū pars qdē eius tenuis penetrabit, crassa uero retinebit, acq̄rit aut iuuamentū p id quod penetrat ueluti solet efficere coriandrū, cū fit ex eo & polenta emplastrum ad strumas (scrophulas dicūt.) Emplastra tamē linimētis similia sunt uerū emplastra sūt crassa tenacia. linimēta uero fluida, Multoties quoq; linimēta admouētur ex frustis pāni. Cū igit mēbris nobilibus uelut iocinori & cordi imponuntur si huiusmodi pannus ex cruda aloe suffitus fuerit summopere iuuabit uiribusq; linimentorum odoratam uim prestabit pro ut res exposcet.

**¶** Caput. 19. fen quartæ. De embrochis seu irrigationibus.

**E**Mbroche quidē prestātissima presidia sūt ubi desideratur ut a capite & aliis particu

lis aliquid dissoluatur, ac ubi necessarium est  
 tēperaturā aliquā pmutare, Qd si aliqua mē-  
 bra postulāt irrigationē calidā & frigidā si eo  
 nō cōfluāt excremēta primo quidē calidā irri-  
 gationē mox aquā frigidam admouebis ut ro-  
 bur illis inferatur. Qd si contra res se habeat  
 tunc ab aqua frigida incipiendum est.

Caput. 20. sen quartæ. De uene sectione.

**V**ene sectio est euacuatio uniuersalis quæ  
 plenitudinem euacuat & ipsa plenitudo  
 est humorum generatio in uenis, maior q̃ sua  
 mediocritas exposcat. Vena autem incidi de-  
 bet duorū alteri . nempe uel illi qui egritudi-  
 nibus obnoxius est, in quas corruet si eius san-  
 guis multiplicetur, uel qui in eas iam incidit,  
 horumq; utriq; uel pre sanguinis exuperātia  
 uel pre eius malitia aut ppter utrūq; uena se-  
 catur. Egritudines uero quibus ille paratus est  
 incurrere sunt coxendix & podagra si sangui-  
 nec eiusmodi egritudines fuerint dolorq;  
 articularis qui a sanguine ē, & sanguinis screa-  
 tus cum accidit alicui propterea q̃ in eius pul-  
 mone, aliqua uenula rupta fuerit parum ad-  
 modum conglutinata, quæ quidē scindetur si  
 sanguinis uel minimum augeatur . Ad hæc q;  
 parati sunt incurrere morbū comitialē & atto-  
 nitū (quē apoplexiā nōcupāt) ac atrā bilē ex sã  
 guis redūdātia & gña angīe uiscerūq; abscēss⁹

## CAP V T

atq; calidas lippitudines ( quas ophthalmias dicūt. ) Is etiā cui sanguis hemorrhoidarum q̄ cōsueuit effluere: suppressus est: ac mulieres q̄ bus mēses restricti sunt uene sectione indigēt. Horū tamen duorum color non indicat necessariā esse uene sectionem: ob eorū squalidum obscurū colorē albumq; atq; citrinum. Porro qui membra intrinsecus imbecillia ex calida tēperatura obtinēt his profecto satius est tēpo re ueris sanguinē detrahēre etsi nondum ī huiusmodi morbos inciderit. Item percussis uel ab alto delapsis sanguis demēdus ē ad precautionem: ne in eis apostema oriatur. Adhuc aliquo apostemate laboranti de quo ne ante maturationē rumpatur uereatur sanguis detrahēdus ē etsi uene sectione non indigeat neq; ulla adsit redundātia. Scire quoq; debes q̄ si in huiusmodi morbos nōdū q̄s inciderit. timeat tū ne eis corripiat̄ tuti⁹ ei cōcedi uene sectionē. Sed si in eos iam lapsus fuerit tū in eorū principio penitus abneganda est. attenuat enim excrementa per corpusq; ea permeare facit & sanguini integro ea quoq; admiscet: immo nihil forte oportuni euacuabit cogetq; uene sectionē nō sine noxa repetere ubi uero cōcoctio apparuerit & principium atq; uigor iam transierit: tunc si uenam secare est necessariū & nihil prohibeat secetur. Atqui nec uene incisio nec euacuatio



euacuatio est faciendā in die motus morbi: est enim dies qua tum requies tum somnus iduci debent in eaq; ipse affectus incitatur. Cūq; egritudo habuerit iudicia (quæ crises appellatur) ac lōgi fuerit spatii. haud quāq; debet mltā quantitas sanguinis euacuari imo si fieri potest quiescat sin minus parce fiat sanguinis detractio & sanguis qui per uene sectionem detractus ē suppleatur corpori si poteris. roburq; uirium custodias in iudiciorum pugnā. Et si quis iam diu non est usus uene sectione & i hyeme lassitudine corporis moleste, ei profecto uena incidenda est & sanguis ad uirtutem roborandā restituendus. Cæterū uene sectio trahēdo ad cōtrariū aluum ualde astringit. Porro cum ex copiosa sanguinis missione uires imbecilliores reddūtur multi humores uitiosi inde gignuntur. Animi autem deliquium, quod syncopis uocat. accidit quidem initio uene sectionis quia quod insuetum ē obuiat precedēte tamen uomitu id prohibet. Itidē efficit uomitus factus dum accidit syncopis. Nec te lateat uene sectionē perturbationē excitare donec quiescat. Dolor adhuc colicus raro cū sanguinis missione cōplicari potest. Grauidis præterea ac quibus mēstrua redduntur nō concediē uenæ sectio nisi magna emergēte necessitate ueluti si necessarium sit magnum sanguinis

## CAPVT

excreatū siftere si uires cōsentiāt. Scire adhuc debes nō regri semp uenæ sectionē ubi adsint signa repletiōis p̄dicte imo fortasse erit repletiō ex crudis humoribus & tunc sanguinis deductio ualde nocebit. Qm̄ si uenā secueris nō fiet cōcoctio & uerēdū est ne eger pereat. Ille p̄terea in quo atra bilis superat nihil offendet si uena ei scindat̄ & postea purgatione euacuetur. Sed ipsum colorē inspicere debes. sub conditione quā dicemus tentionēq; animaduerte renā si tētio p̄ corpus expādatur ipsa cōiectura docebit uenæ sectionē esse necessariā. Sed si sanguis eius optimus paucus fuerit & in corpore multos humores uitiosos habuerit: tunc sanguinis missio bonū tollet & uitiosum reliquet. Sed si qs paucū & malū obtinet sanguinē & ad aliquod mēbrum se cōuerterit ita ut illud ualde offendat, nec a uenæ sectione excusari possit. tum exigua quantitas sanguinis detrahatur mox optimo alimēto refici debet. De inde tēporis spatio iterū alia uice sanguis mittat̄ ut uitioso sublato optimus restituat̄. Qd̄ si eius uitiosi hūores fuerit biliosi oī ingenio uti oportet ut p̄rio solutione alui aut uomitu euacuent̄ & q̄scāt oīq; studio reges atq; ociū egro inducātur. Sed si crassi fuerit hūores. antiq; iusserūt balneo uti & aluū subducere. Nō nūq; p̄terea añ sanguinis missionē & postea añ

repetitionē exhibebūt syrupū acetosū uī attenuādi obtinentē cū decocto hisopi & satureie. At si cogaris uenā icidere uirtute exñte debili ob febres aut uitiosos hūiores tūc sāguis detractionē ī plures uices ptiri ut pbauimus satius erit. Porro angusta uenæ sectio uirtuti utilior ē, uerū forte sanguis tenuis & clar⁹ ex ea fluēt crass⁹ iterī ac turbulēt⁹ retinebit⁹. Latior uero citi⁹ aī deliquī ifert, & ad expurgationē magis facit ad ḡglutinationē uero tardior ē. cōmodi⁹ or āt ē illi cui ut mūdificet⁹. uena secat⁹ atq; pinguib⁹ itidē tpe hyemis latior cōmodior est ob sanguinis coagulationē. estate uero angustior si ea indiguerit. Cūq; uena inciditur iaceat supinus. huiusmodi enim situs ē ad uirtutem custodiendam aptior, nec in animi defectū incurret. In febribus aut uehementis inflāmationis, non est uenæ sectio admittenda nec initio cuiusuis febris non acute neq; in diebus circuitus. ubi præterea in febribus conuulsio associatur raro debet concedi uenæ sectio quamuis uideatur esse necessaria quia conuulsio uigiliam atq; sudorem affert uiresq; deiciet, idcirco relinqui debet sanguis qui sit pro tempore necessitatis paratus. Itidem in febribus non putridis si sanguis mittatur sit exiguus ut pro febrium resolutionē sanguis prōptus dimittatur. Quod si febris non fuerit magni

estus, fuerit tamen putrida. tunc decem illas conditiones predictas inspicere oportet, mox uenam inspicias quæ si crassa fuerit ad ruborem declinans & pulsus magnus & figura tumida & febris in motu suo non fuerit uelox, tunc uenam incide uacuo uentriculo. At si urina tenuis uel ignea fuerit figuraque ab initio morbi extenuata caue ne uenam feces. Quod si febris illa interpellata fuerit ac in ueram quietem desierit in illis sanguis mittatur. Rigorem quoque contemplari debes nam si fuerit uehemens caue ne uenam aperias inspicereque debes colorem sanguinis que egreditur, quoniam si fuerit tenuis ad albedinem attinens illico eum retine. Et in uniuersum cauere debes ne egroto duorum alterum afferas, uel humorum biliosorum pruritum uel frigidorum cruditatem. Cumque in febre cogimur uenam secare, non animaduertas dicta illius qui dicit, eam post quartam diem non habere locum: imo urgente necessitate potest admitti etiam post quadagesimum: & hæc est sententia Galeni, quauis apparentibus ueris indicationibus satius erit eam quam citissime anticipare. Quod si id quod conueniebat neglexeris tunc quocumque tempore poteris uri uene sectione, dummodo conueniat, utere ea, consideratis tamen prius illis decem conditionibus iam dictis. Nonnumquam præterea fit uene apertio etsi non indigeas ea in ipsis febribus, ut dimi-

nuta materia eam natura superare ualeat, ipsa  
tamen habitudine etate uiribusq; una cum re/  
liquis. consentiētibus. In febre uero ex sangui  
ne pendente nō potest euitari sanguinis detra  
ctio quā in principio nō exhuberans, tempore  
tamen cōcoctionis copiosa fiat. Sepissime ta//  
mē recedit ipsa febris post sanguinis detractio  
nē. In habentibus autē tēperaturā immodice  
frigida & in regionibus ualde frigidis & dum  
dolor est ualidus & post balneum uires dissol/  
uens atq; post ueneris usum, in etate quoq; mi  
nore quatuordecim annorū euitāda ē uenæ se  
ctio quoad fieri poterit, in ætate senii quoq;  
quantum fieri poterit caue ne sanguinem e ue  
na mittas nisi forte in corporis habitu ac mu/  
sculorū dēsitae uenarū amplitudinē earūq; ple  
nitudinē, ac coloris rubore cōfidam⁹, his. n. hor  
tātibus tā senioribus q̄ pueris potest concedi.  
Iuniores uero parca sanguinis subductiōe pau  
latim ad id duci debent. At quicūq; supra mo/  
dum sunt obesi uel macilenti aut carnis rarita  
tē obtinētes & pituitosi tumidiore, & pueruli  
qui sunt sanguinis expertes his uenam incide/  
re quātū possibile est caue & qui diu egrotaue  
rint nō sine maximo discrimine sanguinē de/  
trahere licet nisi forte in his sanguinis corru/  
ptio id hortaretur, tunc enī potest sanguis mit  
ti, & illum inspicere debes qui si niger crassusq;

fuerit eum extrahe. Sed si eū album tenuem  
 uideris claude statim quoniam maximū peri-  
 culū afferet. Post cibi repletionem quoq; ca-  
 uendū est uenam incidere ne humor incoctus  
 ad uenas trahatur loco rei euacuate: quod qui-  
 dem obserdandū adhuc est uentriculo existen-  
 te repleto ac intestinis: excremento sicco con-  
 cocto uel fere cōcocto abūdantibus. Sed quod  
 in ipso uentriculo & sibi annexis existit uomi-  
 tu euacuare studeat: ab itēstinis uero inferiori-  
 bus ut fieri poterit etiam si clysteri id fiat. Por-  
 ro qui fastidio laborat caueat uenam aperire  
 sed differat donec eius satietas concoquatur.  
 Caueas etiam ne uenam incidas eius qui acu-  
 men sensus uentriculi uel imbecillitatem &  
 generatione bilis in ipso uentriculo infestari  
 solet is cauere debet ne a uenæ sectione incur-  
 rat periculum: & presertim dum est ieiunus.  
 Eū aut q acumen sensus oris uētriculi obtinet,  
 cognosces, qā à rerū mordicātiū deuoratione  
 molestat. Qui uero imbecillū ipsū habet: eo  
 quod ipsam quoq; appetētiam habet imbecil-  
 le: doloresq; uētriculi patitur. At cuius orificiū  
 uētriculi cholera recipit: uel solet sepiissime in  
 eo generari: ex assīdua nausea: ac frequentissi-  
 mo bilis uomitu: nec non ex eius oris amaritu-  
 dine id dignoscere poteris iis inq; si uena feria-  
 tur: nō habita præcautione prius ad oris uētri-

culi confortationem, in maximū incurrēt discrimen: & forte aliqui eorum mortem subibūt. Quo circa si quis acute sentit, uel qui imbecillioris uentriculi est, debet sumere frustra panis purissimi musto cocto acetoso odorato perfusa. At si ea imbecillitas à frigido temperamento proueniat: tunc debes ea perfundere: aqua muscata (quam such uocant arabes) cū aromatis: aut syrupo de mēta odorato in quo muscus ingreditur: aut miua muscata: deinde uena secetur. Ille uero in quo bilis generatur: debet uomitum aqua calida liberalissime epota prouocare, ex syrupo acetoso deinde aliquid degustare: parumq; quiescere: mox uenam secare: oportet autem uti omni diligentia: ut id quod de optimo sanguine deperditū est restituatur: ueluti carne super carbones aspersa si robustus fuerit: quāuis sit is cibus satis grauis: nam si concoquatur in multum ac optimum conuertetur alimentum. debet tamen esse id exiguæ quantitatis: quia uenæ sectio imbecillem reddit uentericulum: porro quandoq; inciduntur uenæ: ut profluuium sanguinis e naribus nel utero aut sede uel ex thorace prohibeat: aut ex aliquibus uulnerib⁹: ut ipse sanguis ad oppositā retrahat partē: hoc enim est p̄sentaneū remediū. foramen aut debet eē ualde angustū. uicesq; debent pluries iterari,



non tñ eadem die (nisi urgēte necessitate) sed  
 Al. lra alternis diebus: & qualibet uice minor fiat de  
 uariis tractio: & ut summatim dicā: pluribus uicibus  
 sanguinem detrahēre, satius est, q̄ multiplicā  
 re quātitatē: ferire prætērea uenā: cū nō fuerit  
 necessarium: bilem incitat, ariditatēq; linguæ  
 relinquit & alia id genus: cui rei succurrendū  
 est: aqua ordeī ex sacharo & si quis sanguinis  
 missionē repetere uoluerit: & ex priori uenæ  
 sectione: nullum conuulsionis nocumentū: se  
 quutū fuerit: uel aliud simile: uenā manus per  
 lōgū debet incidere: ut motu artus prohibeā  
 cōglutinatio & dilatetur. Sed si adhuc dubita  
 ueris ne celerrime coalescat: tūc pānum oleo:  
 & pusillo salis madefactū supponas: qui supli  
 getur: porro, si quū uenā apueris scalpellū per  
 unxeris: uelox qdē conglutinatio phibebitur  
 dolorq; mitior erit dummodo leniter: oleo  
 uel alio simili superinungatur: aut ipso oleo  
 madefiat deinde panno detergatur. Dormire  
 insuper inter uenæ sectionē: & iterarionē: fora  
 men coalescere celeriter cogit. Nec obliuioni  
 tradas. quod diximus solutiua euacuationem  
 in hyeme: diem austrinā desiderare: idem enī  
 expostulat ipsa uenæ sectio: foramen prætērea  
 uenæ sectæ: delirātium & stolidorū: ac eorū q/  
 bus noctu. tēpore somnii: sanguis imittēdus ē  
 debet esse angustū: ne sanguinis profluuium

inducatur. Idem tamen cui nō ē necessaria iteratio, fieri debet. Nec te lateat iterationem eē tardādam: iuxta magnitudinem imbecillitatis. Quod si nulla affuerit imbecillitas eius terminus est una hora. At si per huiusmodi sanguinis missionem intēdimus attractionē facere: tunc eius terminus erit unus dies. Obliqua autem uenæ apertio: illi qui eadē die: ea uero: quæ per latitudinem: illi qui statim eā iterare proposuit: conueniētiore est. Sed quæ per lōgū fit: magis conuenit illi: qui nō est contentus una tantū iteratione. & illi q̄ per multos dies, quotidie uult de suo sanguine aliquid detrachere: & quanto uenæ apertio maiorem intulerit dolorē: tanto tardius conglutinabitur. Porro quū per iterationē uberrima fit euacuatio: affert animi deliquiū nisi forte corpus ad plethoriam declinet: aut ille cui iteratio fit: aliquid preassumpserit. Inter uenæ apertionē præterea & iterationem: dormire. excrementa cū sanguine expelli prohibētur: cū humores p̄ somnū ad imā partē corporis retrahantur. Inter cætera autem iuuamenta iterationis unū ē uidelicet: q̄ uires illius cui sanguis mittit̄ cōseruātur: ac euacuatio ei conueniēs perficitur. Melior uero iteratio est: quæ duobus aut tribus differtur diebus. Ad hæc illico à uenæ sectione: dormire lassitudinē mēbrorū inducit.

Balneum quoq; ante uenæ sectionem fortas-  
 se reddet eā difficilem, quoniā cutim crassio-  
 rem ac leniorem efficit: eamq; lubrico lapsui  
 parat, nisi is crassissimū habuerit sanguinem:  
 Ille præterea cui uena secatur: non debet uni-  
 ca uice tantum cibo repleri. Sed sensim cibari,  
 & in primis tenui uictu uti. Neq; post eam  
 quoq; deambulare debet. Sed supinus iacere:  
 nec post eam etiam debet uti balneo dissol-  
 uente. Et cum ex uenæ sectione, manus intu-  
 muerit alterius manus uena secari debet &  
 quantum uires ferunt sanguinem extrahere:  
 & tumori unguentum cerusæ admoueatur:  
 & partes circūiacētes: remediis uehementer fri-  
 gidis liniantur. Si quis præterea abundātiā  
 humorum habuerit & ei uena feriat: ipsa  
 quidem uenæ sectio erit causa irritationis illo-  
 rum humorum uelocisq; motionis ac mixtio-  
 nis eorum, indigebitq; frequenti uenæ aper-  
 tione. Ad hæc sanguis melancolicus, frequen-  
 tem desyderat uenæ sectionem, quam statim  
 alleuiatio excipit. In senectute tamen aliquas  
 postea inducit egritudines ut morbum attoni-  
 tum (apoplexiam uocant) porro uenæ sectio  
 sepiissime excitat febres. Sepiissime tamen pur-  
 tredinem dissoluit. Cuicūq; præterea sano san-  
 guis detrahitur assumendum est id quod in  
 tractatione de uino predictum est. Nec te la-

teat, nihil aliud q̄ uenas uel arterias in corpo-  
 re aperiri, sed arterias rarius, idq; non sine dis-  
 crimine ob sanguinis profluuium. & raro ge- Al. lra  
 nerat apostema: & id quidem quum scissura & mi/  
 fuerit ualde angusta. uerum cum non time- nimū  
 mus sanguinis profluuium arteriæ, summo qđ faci  
 pere iuuat in quibusdam egritudinibus parti at est  
 cularibus: propter quas inciditur ipsa arteria. a pa  
 precipuum autem iuuamentum, quod ex ar-  
 teriæ incisione acquiritur, est ubi in aliquo  
 membro ei uicino aliquæ malignæ egritudi-  
 nes fuerint: quæ à sanguine tenui calido de-  
 pendent. Si igitur incidatur arteria illi uici-  
 na nullo iminenti periculo: tunc summopere  
 opitulari uidetur.

In manu autem sex uenæ inciduntur uideli-  
 cet capitalis (quam uocant cephalicam) & me-  
 dia (quam nigram appellât) & iecoraria (quæ  
 basilica nuncupatur) & funis brachii, & quæ  
 inter anularem & minimum digitum inter-  
 currit (quam uocant arabes sceilem.) Et axilla-  
 ris, quæ est ramus iecinorinæ: sed inter omnes  
 cephalica est tutior. Et quelibet illarum tri-  
 um debet supra angulum cubiti brachii incidi  
 non infra, neq; e regiõe ipsius, ut sanguis pos-  
 sit cōmode egredi quum destillat. Nocumen-  
 taq; neruorū atq; arteriarū tutius euitāt, itidē

## CAPVT

de cephalica intelligi debet. Incisio tamen earum p longum tardius conglutinatur. quoniam sūt articulose: in nō articularibus uero res opposito modo se habet. Sed uena coxendicis ac anularis & reliquæ uenæ debent p lōgū incidi. Cephalica aut debet incidi ifra caput musculi in loco molliori: & foramen amplū fieri. Nec foramen foramini addatur: quoniā apostema parit. Et si qd erroris cōmittatur in uenæ cephalicæ sectione: ut plurimū id nō committitur unica tātum percussione quantūcūq; fuerit magna, Sed læsio ex iteratis percussionebus infertur. Eius uero sectio quæ tardius coalescit: est illa quæ fit p lōgū. Quod si sectionē te iterare cogitas: dilata foramen: & si non inueniatur: queratur aliquis ramus partis exterioris brachii. At media uena: ob neruum sub ea existentē periculū minatur. Nōnūq; tamen inter duos neruos iacet: & tūc oportet uti omni diligētia: ut per lōgū incidatur, eiusq; sectio uenā leniter perstringat: & fortasse super ipsā exabit aliquis nervus tenuis instar chordæ itē tus. quæ quidem res dignosci debet: & cauere ne percussio eū offendar: quoniā diuturnā sensus destructionem pariet.

At qui neruos crassiores obtinet. is ramus ī eo manifestior est. in quo si error cōmittatur erit maioris nocumēti: quod si error cōmittat̃ &

percussus fuerit ille nervus, non agglutines sectionē uenæ sed admoue ei, quod conglutinationē cohibeat: & cura eam curatione uulnē neruorū, de qbus iam in libro quarto fecimus sermonē. Caue præterea ne quod infrigidet, ut est succus solani & sandalū ei admoueas: sed eius partes totūq; corpus calido oleo pungas. Venam autē funis brachii satius est in obliquū secare: nisi utrīq; subterfugiat: tūc enim in lōgū incidatur. Basilica uero maximo cū discrimine inciditur propterea q̃ arteria ac musculi neruiq; sub ea existūt, animaduerte igitur in eius incisione: quoniam si icidatur arteria uel nullo modo: uel cum maxima difficultate sanguis sistetur: sūt præterea aliqui habētes utrīq; circū basilicā duas arterias quarū si una describat̃ existimatur esse in tuto: cū tñ forte feriet̃ altera. Id aut̃ animaduertēdū est: & cū ligatur apparebit ibi ut plurimū tumor uel arteriæ: quādoq; uel basilicæ: sed utcunq; fuerit debet solui deligatura tumorq; blāditer pungi, deinde iterū ligare. Quod si iterum tumor redeat: tu quoq; iterū redi ad idem, & si id nō sufficiat: nō erit inutile si basilicā dimittas: & ramū: qui dicitur axillaris qui ad īternam partem brachii infra existit icidas: multoties quoq; tumor augetur. & multoties ligatura sedat pulsum arteriæ, eamq; eleuat & attollit &

## CAPVT

pro uena reputatur, & inciditur: cūq; aliquā li-  
 gaueris uenam & ex huiusmodi ligatura ap-  
 pareant super ipsam ueluti lenticulæ & cicera,  
 tūc quod de basilica diximus idem hic agere  
 debes: Basilica insuper quanto inferius ad bra-  
 chium eam incidas, tanto tutius est. Scalpellū  
 aut debet per uenā pcedere uersus oppositam  
 partem arteriæ: & error qui in basilica comit-  
 titur, nō est ratione arteriæ tātū: Sed quia sub  
 ea est musculus & neruus. & eorū causa error  
 cōmittitur ut iam paulo ante diximus. Iudici-  
 um uero quo dignoscere possis errorē fuisse  
 cōmissum in basilica & fuisse percussam arteri-  
 am: est quia sanguis tenuis egreditur flauus &  
 quodā ueluti saltu eiaculatur, leniq; ac demis-  
 so quodā tactu. & tūc debes celeriter aliquid ī  
 foramē intromittere uelut pilos leporis ex ali-  
 qua portione thuris ī puluere redacti, & achil-  
 leā fideritē (quā supciliū ueneris, & sanguinē  
 dracōis uocāt) & aliqd aloes & mirræ & chal-  
 citidis & mysi, & asperge cū aqua frigida quā-  
 tū poteris: locū aut incisionis arcte liga: q̄ astri-  
 cta nō soluat p̄ trēs dies: post tertiū uero diem  
 adhuc debes obseruare: quātū poteris: ut em-  
 plastra astringētia ei parti adhibeant. Multi tñ  
 sunt q̄ illā arteriā penitus secāt ut uena cōuel-  
 lat & carne cooperiat astringaturq;: sed com-  
 plures ob sanguinis profluiū perierunt. Aliq



etiā ob uehemētē dolorē ligaturæ cui<sup>9</sup> strictu-  
ra ualida querit̃ ad phibendū fluxū sanguinis  
arteriæ: ita ut mēbrū ad pditionem deueniret  
mortē subierūt. Nec te lateat q̃ nōnūq̃ sangui-  
nis pfluuiū accidit quoq̃ in uenis. Ad hęc sci-  
re debes: q̃ uena humeralis ex collo & supra  
ipsū magis: infra uero: minus de sanguine eua-  
cuat, nec terminū regionis hepatis ac partiū p-  
cordiorū trāsīt: neq̃ de inferioribus partibus  
aliqd educit: quod alicuius sit momēti. Media  
præterea: commune habet iudicium inter ce-  
phalicā & basilicā: & ipsa iecinoriā euacu-  
at a partibus thoracis: quæ ad inferiora uer-  
gunt. Et brachialis similatur cephalicæ: ea ue-  
ro uena: quam sceilen uocant: dextra qui-  
dem ut aiunt doloribus hepatis: sinistra ue-  
ro lienis cōferre uidetur: & ut debeat apertio  
eius tandiu dimitti: donec sanguis sua sponte  
fistatur. Manus præterea eius cui uena secatur  
debet calidæ aquæ admoueri: ne sanguis facile  
retineatur dum segnius fluit ut pluribus eorū  
quibus uena sceilen secatur euenire solet: præ-  
stantior autem sectio ipsius sceilen est: quæ in  
longum fit. Axillaris uero idem est cum basili-  
ca iudicium. At qui arteria: quæ in manu inci-  
ditur: est illa quæ super dorsum palmæ existit,  
quæ iter idicē & pollicē iacet: & est p̃sens reme-  
diū epatis ac septi trāsuerfi doloribus antiq̃st

& Galenus refert se uidisse in somnio uirū dolore epatis laborātem, cui precepit hoc, & ita fecit, unde sanatus fuit. Secat adhuc nōnunq̃ alia artetia, quæ magis hac ad internam partē palmæ declinat, quæ q̃dem simile huic affert iuuamētū. Si quis p̃terea uoluerit e uena manus sanguinē emittere: & non potest: nequaquā uolētā inuolutionē, ac delegationē, impertune agat, neq; percussionem scalpello iteret: sed sic per diē uel biduū dimittat. At si cogat percussionē iterare: eam quidē supra nō infra primā iteret. Violenta autē ligatura apostema affert. Infrigidare quoq; fasciā: eamq; ex aqua rosacea uel aqua frigida humectare satis cōuenit & cōfert: ligatura quoq; nō dimoueat cutē a suo loco nec ante nec post uenæ sectionē. Valida præterea deligatio in corporibus macilentis est causa inanitionis uenarū ac sanguinis retentionē sed in pinguioribus lenta non permittit apparere uenas, nisi ualida fiat. Quidam quoq; eorum q̃ uenā incidūt solēt uti astutia ut dolor nō percipiatur, soporē manui ex forti ligatura inducēdo per horā. Nōnulli tñ scalpelli aciem oleo perungūt & hoc ut paulo ante diximus dolorē mitigat: conglutinationēq; remoratur. Cūq; predictæ uenæ in manu non apparuerint sed rami earū. tunc manu premi debent fricādo. Quod si cessante frictione cōfestim

festim eo fluxerit sanguis qđ & locus intumes-  
cat, tūc icidant, sin min⁹ nequaq̃. At cū ablu-  
re uoluerit trahat parū cutim ut foramen clau-  
dat, mox suo loco eā restituat. fascia aut optie  
adhereat. Estq; cōmodior q̃ in orbē fit inuolu-  
tio eaq; supinuolui debet. Cūq; in foraminis  
orificio pinguedo apparuerit, sensim intro re-  
uocari nec abscondi debet, neq; in his ē adhibē-  
da diligētia ut fiat iteratio sine p̃cussione. Hu-  
ius tñ negocii sentētiā adhuc p̃ficiā in calce hu-  
ius capitis, nā interloquēdū de eo obiter in ser-  
monē incidimus. Nec te lateat sanguinis a stri-  
ctionē, incisionisq; ligationē: habere tēpus sibi  
statutū, & si id diuersū sit: nā aliq; & si febriēs  
fuerit: poterit ferre emissionē qnq; aut sex li-  
brarū sanguinis: qđā uero & si san⁹, adhuc uni-  
us libre extractionē sustinere nequit. Circa hoc  
tñ tria sūt cōsiderāda. primo leuitas raritasq;  
sanguinis. secūdo color eius. fortasse tñ faciet ī  
maximū incurrere errorē si priō tenuis ac al-  
bus egrediať. At si signa plethoriæ ibi appare-  
ant & res ipsa sectionē uenæ expostulet nō de-  
cipiaris. Quādoq; ēt sanguinis color fallit ī ha-  
bētibus aliq̃ apata: qm̃ apā trahit ad se sangui-  
nē. Tertio uero pulsus quē haud quaq; negli-  
gere debes. Cūq; sanguinis ipetuosus exitus lā-  
guere ceperit: aut color sanguinis: uel pulsus  
ipse mutati fuerint p̃sertim ad debilitatē: tunc  
f

## CAPVT

eum retine, itidē si oscitationes ac pandicula-  
 tiones nauseaq; acciderit. Quod si cito color  
 aut impetus mutetur recurre ad pulsum: cui  
 adhibēda est in hac re fides. Incurrūt præterea  
 facillime in animi deliquiū: qui calidi sunt tē-  
 peramēti macilēti & corpore raro, difficilius  
 uero q̄ temperaturā moderatā carnisq; densi-  
 tatē obtinēt. Dicit̄ adhuc, q̄ q̄ secāda uenæ ar-  
 tē profiteſ: debet plura habere scalpella. quo-  
 rū aliqua latiorē: aliqua uero angustiore ha-  
 beāt aciem. Quæ uero latioris sunt acuminis:  
 uenis q̄dem fugiētibus ac declinātibus maxi-  
 me accomodantur: ut sunt uenæ iugulares. Is  
 adhuc debet habere pillulā bōbacineā uel serī-  
 cinam. Habeat quoq; instrumēta ad uomitum  
 faciēdū idonea: siue ex ligno siue ex pēna fue-  
 rint. Nec omittat habere apud se pilos leporis  
 & medicamen aloes & thuris. folliculū musci  
 & electuariū ac trochiscos de musco: adeo ut  
 si accidat animi defectus: qui q̄dem in sangui-  
 nis. missione maxime timorē affert: imo forte  
 mortē: festina igiſ tūc intromittere glomū in  
 os ipsius ac uomitū puocato. instrumēto illi ne  
 gocio accōmodato: eumq; folliculū odoret:  
 aliqd quoq; electuarii aut trociscorum de mu-  
 sco deuoret ut uires excitent̄. Quod si sangui-  
 nis pfluuiū ex arteria pueniat: festina replere  
 foramen leporinis pilis: medicamētoq; aloes.

Et raro accidit syncopis dum sanguis ægredi-  
tur: sed ut plurimū postq̃ sanguis susterit acci-  
dere solet: nisi forte plus iusto effluerit. In fe-  
bribus autē cōtinuis: ac in initiis attoniti mor-  
bi (apoplexiā uocat.) In anginis magnisq; ab-  
fcessibus interimentibus ac ualidis doloribus  
uirtute existēti forti. si pterrearis si uideas syn-  
copim accidere. Sed qm̃ interloquēdum de ue-  
nis manus incidimus in amplissimā orationē  
de aliis negociis adeo ut & uenas pedis aliasq;  
ommisserimus: ideo iustū iudico ad sermonē  
uñ digressi sumus redire. Dico igit̃ inter ue-  
nas pedis. Aliā qdē esse coxēdicis: q̃ in extrema  
pte malleoli incidit̃ siue supra: siue infra ipsū  
deligādaq; est pars suprema: uidelicet à crure  
usq; ad foramen: stricteq; deuoluenda: satius  
quoq; ē eā antea abluere. i lōgumq; incidere.  
Quod si obscura fuerit. incidatur aliquis ra-  
mus eius: qui inter anularem & minimum  
digitum existit. Incidere autem coxendicē effi-  
cacissimū affert p̃sidiū: & p̃sertim podagrā. ua-  
ricib⁹: morboq; ælephāti: sed iterare ei⁹ icisio-  
nē difficile qdē ē. Alia uero ē ea uena (quā sa-  
phenā uocat) q̃ i īterna pte malleoli locata est  
& magis q̃ coxēdicis est euidēs: hæc autē ad eua-  
cuādū sanguinē, a mēbris, quæ infra hepar exi-  
stunt: eūq; à sup̃nis partibus ad infernas euocā-  
dum incidit̃: & ideo mēses uehementer citat

orificiaq; mariscarū aperit: porro licet rō ipsa  
 dictitet sectionē uenæ coxēdicis & saphenæ. iu  
 uamētū nō absimile p̄stare. Experiētia tñ com/  
 probatū ē: lōge efficacior ē esse utilitatē incisio  
 nis uenæ coxēdicis i dolore coxēdicū: & id for  
 te pp eius rectitudinē puenit. Venæ p̄terea sa/  
 phenæ sectio p̄stātior ē, q̄ fit in obliquū ad latit/  
 tudinē uergens. Alia adhuc est uena: q̄ in angu  
 lo genu existit nec eius p̄sidiū ē multū diffimi  
 le ab eo qđ saphenæ: Verū ad mēses ciendos &  
 sedis hemoroidarūq; dolores, p̄stātior q̄ saphē  
 næ ē remediū. Itē ē alia uena in postrema pte  
 calcanei sita: q̄ est ueluti ramus saphenæ: & ua  
 let ad ea q̄ & ipsa saphena. Generatim aut uer/  
 narū pedis incisio: ad egritudines: q̄ fiūt ex ma  
 teriis caput petētibus ac ex atra bile ortis ualet  
 sed uires magis q̄ ea: q̄ uenarum manus debili  
 tat. Ad hęc uenæ: q̄ in partibus capitis incidun  
 tur: satius est eas in obliquum incidere p̄ter iu  
 gulares (guidez Arabes uocant.)

Inter uenosa p̄terea uasa. qđā sunt uenæ: qđā  
 uero Arteriæ. Venarū aut alia ē uena frontis: q̄  
 inter duo sup̄cilia īsidet: cuius īcisio cōfert do  
 lori capitis & p̄sertim in occipitio eius graue/  
 diniq; oculorū atq; antiquo capitis dolori affi  
 duo (cephaleā uocāt) Alia uero ē q̄ sup̄ calua  
 riā sedet ad hemicraneā & capitis ulcera secta  
 iuuat. Aliæ adhuc duæ sunt: q̄ apud utraq; tpa

extāt reflexæ uenæ: ac aliæ duæ in angulis lachrymalibus (cantos uocāt) q̄ ut plurimū: non se offerūt: nisi p̄ gutturis suffocatiuā astrictiōnē: i qbus scalpellū nō debet p̄fūdus agi. Quoniā forte ex ossis p̄cussione affectus ille oriret̄ (quē aegylopē seu fistulā lachrymalē uocant) ex eis tñ exigua quātitas sanguinis distillat̄ solet. Earū aut̄ sectio ad dolorē capitis ac hemi-craneā: lippitudinēq; diurnā (quam obthalmiā uocāt) ad lachrymarū distillationē: ad suffusiones: seu cecitates: ac ad palpebrarū scabiē: earūq; ortū & ad nyctilopā satis ualet. Aliæ quoq; sunt tres uenæ exiguæ: q̄ ubi desinit extrēa pars auris: capillis cōiūcta existūt, earū aut̄ ultima triū euidētior ē, q̄ in initio suffusiōis & ubi caput recipit uapores à uētriculo secat̄. & propterea iuuat ad auriū ulcera & occipitis & partis postremæ capitis. Galenus autē negat id qđ nōnulli affirmāt uidelicet: qđ uiri cōtinētes secat̄ ambas uenas q̄ sunt post aures: ut uirile semen illinc abscindat̄. Sūt & aliæ duæ uenæ iugulares q̄ in principio lepræ & ualidæ anginae incidunt̄ & i respirādi difficultate (dyspnoea uocat̄) & in asthma calido: & in uoce rauca: q̄ inest patiētib⁹ pulmonariā egritudinē (quā pipeumoniā appellāt) & in mētagra: seu lichenē: q̄ ex excessi uo calore sanguinis puenit: ac i lienis affectibus & p̄cordiorū. Et ut paulo ante



diximus huiusmodi incisio debet fieri lāceola  
 latioris aciei. ligatura aut debet fieri capite in/  
 clinato ad oppositā partē sectionis ut uena tē/  
 dat. Inspiciēdaq; ē ea pars: q̄ ē p̄liuior: cuius  
 qdē pars opposita ē incidēda. & obuolutio de/  
 bet ī latū: nō in lōgū fieri ueluti fit in saphena  
 & coxēdice. incisio tñ debet in lōgū cadere. Est  
 & alia uena: q̄ ē ī extrema pte nasi (quā uocāt  
 leporinā) & incidit pars extrema nasi bifida:  
 q̄ digito p̄ssa bisulca uidet̄ ibiq; perforet̄. San/  
 guis aut q̄ dē ea fluit exiguus ē: cuius sectio ua/  
 let ad lētigines faciei obscuritatēq; coloris. ma/  
 riscalas: exanthemata: seu tubercula, nasi ad eiuf/  
 q; pruritū: uerū aliqñ inducit diuturnā rubedī/  
 nē faciei: q̄ serpigini similatur: q̄ qdē adeo per/  
 faciē expandit̄: ut eius nocuētū maius sit iu/  
 uamēto. Vene uero: q̄ sunt post aures sub ossi/  
 bus eminētibus e regione occipitii (Arabes ca/  
 sasa ea ossa uocāt) si incidātur: cōferūt lippitu/  
 dini: q̄ ex tenui sanguine ortū habet ac diutur/  
 nis capitis doloribus. Alie insuper sunt uenæ  
 quattuor: quæ super labia iacent: binæ scilicet  
 super singulo labio. Quarū incisio ulceribus  
 oris ac fauciu (Alcola Arabes uocāt) necnō gin/  
 giuarū earū relaxationi: atq; abscessibus & he/  
 moroidibus earumq; scissuris confert. Sunt &  
 aliæ uenæ sub lingua intra mentum: quæ ad  
 anginas apostemata tonsillarum (seu ut uocāt

duarum amigdalarum) inciduntur. Reperiū-  
tur adhuc aliæ uenæ sub ipsamet lingua: quæ  
ad grauedinem linguæ: quæ à sanguine est or-  
ta inciduntur: & per longum incidi debent: nā  
si per latum inciduntur. difficile erit sangui-  
nem sistere. Est quoq; alia uena in yma parte  
labii: quæ ad oris fetorem inciditur. Item re-  
peritur alia uena mandibularum: quæ ad oris  
uentriculi curationem inciditur. Arteriarum  
autem capitis quædam est apud tempora: quæ  
aliquando more aliarum aperitur: aliquando  
uero tota discinditur: nōnūq; etiam distrahitur:  
quandoq; uritur: idq; ut acres ac tenues de-  
stillationes sistantur fieri solet: ut quum ocu-  
lus dilatari incipit. Sunt & aliæ duæ arteriæ  
post aures: quæ ad uaria lippitudinis genera  
ac principium suffusionis hebetudinemq; ocu-  
lorum & nyctilopam & ad dolorem capitis  
diuturnum inciduntur: non tamen sine disci-  
mine: earumq; agglutinatio tardior est: Gale-  
nus autem narrat quendam fuisse uulnera-  
tum in gutture: ita ut uulnus eius arteriam at-  
tigerit: unde immodica quantitas sanguinis ef-  
fluxit: cui ipse Galenus succurrit: medicami-  
ne ex Thure & Aloes & Achilleæ: & Myrræ  
itaq; sanguinem suppressit dolorq; diutur-  
nus: quē ī coxa hēbat ablatu est. Ex uenis præ-  
terea: quæ in corpore apiuntur duæ sunt super

## CAPVT

uentrē: quarū altera sup̄ regionē hepatis iacet  
 altera uero sup̄ lienē: ea at̄ q̄ i dextra: ad aquā  
 iter cutim, q̄ uero i sinistra pte exiit ad lienis  
 affectus incidit. Nec te lateat uenæ sectionem  
 hēre duo tpa. Alterꝝ libeꝝ. alterū uero coactū:  
 ex arbitrio qdē est: dū calor diei adest pfecta iā  
 cōcoctione: uiolētū uero tēpus ē: dū urget ne-  
 cessitas ita ut differri nō possit: oisq; cā: q̄ eā p-  
 hibeat negligēda ē: Scias adhuc q̄ lāceola non  
 acuta magnū infert nocumētū: qm̄ nō ptingen-  
 do fallit: & a p̄a atq; dolorē parit: cūq; lāceolā  
 intromittis: nō ipellas eā manu comprimēdo.  
 Sed sensim p̄trāseundo eā ducas: ut eius extre-  
 ma pars: cavitatē uenæ attingat. nā si pluribus  
 uicibus: id ui iterare conaberis: ei⁹ extrema aci-  
 es occulte disrūpet: & sic uena subterfugiet: &  
 nō scindet. Qd̄ si ui coneris uenam incidere:  
 malū addes. Idcirco anteq̄ uenā ferias: & quā-  
 do p̄cussionē iterare cupis. debes expiri in tua  
 cute: quo pacto lāceola se hēat. oī p̄terea indu-  
 soria conari debes ut uena impleat̄ sāguineq; tu-  
 mescat. Sic. n. lubricus lapsus ac recessus ei⁹ mī-  
 nus fiet. Qd̄ si uena occulta fuerit nec impletio  
 sub digito appareat: tū iterū atq; iterū eā solue  
 & liga: atq; punge: & deligationē modo sursum  
 modo deorsum p̄muta donec se offerat. idq;  
 tibi succedet: si latitudine extremitatū duorū  
 digitorū locū ubi scis uenā expādi palpaueris:

ita ut qñq; altero digito premas. altero uero: sanguinē e uena eminere facias: ita ut digito: q; pmanet firmus manifeste p̄cipias & dū eleuat uacuetur: & dū remittit̄ obseruet̄. & inter ultimā lāceolæ extremitatē & manū, aliquantula debet intercipi distātia: ne ad neruū uel arteriam eū penetrare faciat. tutiusq; est ut uena impleatur ubi sit tenuior: lāceola insuper debet pollice & medio digito apphēdi idēq; dimittat̄ ad tētādū: ac in media lamine apphēdi debet & nō supra: qm̄ nō esset recta apphēsiō. Cūq; uena ad aliā partē dimota fuerit occurras ei ligatura & apphēsiōne cōtrarie ptis. Quod si utriq; dimoueat̄ indifferēter: caue ne eā plon gū incidas. Scias adhuc q; deligatio & depressio debet fieri iuxta duritiē ac cutis crassitiē & carnis multitudinē: debetq; ipsa deligatio proxia fieri. At si deligatio uenā occultauerit. describe eā: & caue: ne ipsa descriptio, mobilitate ligaturæ recedat: à sua rectitudine. & cum hoc adhuc suspēde uenæ incisionē. qđ si uena cum difficultate repleat̄ & eleuet̄: tūc pfunde incide p̄sertim in macilētis corporibus: & utere uncino: cūq; ligatura & astrictio sit p̄p̄e artū: non finit uenā repleri & cū locū lauare cupis tūc digitis cutē sup̄ foramen trahe. ut e regione tegatur mox laua. & exicca. fasciolāq; imponas & finito cutē ad locū suū reuerti. Nec te lateat eū

Al. lra  
pūgat

Al. lra  
incipi  
flebo/  
tomiā

qui pre nimia plethoria, sudat, uenæ sectione indigere. nonnūq̃ præterea alicui febrienti: ac morbo comitiali laborāti: cui prout eius affectus exposcit: sāguis missio pueniret. supueni et naturalis alui solutio & tūc ea nō idigebit.

**¶** Caput. 21. fen quartæ. De cucurbitularū impositione ac de earū scarificatione.

**C**ucurbitulæ magisq̃ uenæ sectio ptes sub cutaneas expurgāt: ac magis tenue q̃ crassū extrahūt. pinguib⁹ tñ corpibus: q̃ crassiorē sanguinē obtinēt minus opitulant. Quoniā nō educūt sāguinē eorū ut deceret: sed tenuiorē eius portionē: idq̃ maxima difficultate extrahūt: particulā quoq̃ ubi infigunt ibecilliorē reddūt: ex p̃cepto adhuc est: ne cucurbitulæ admoueanť in initio mēsis: qm̃ humores: nō dū sunt moti uel excitati: neq̃ in eius calce. cū sint diminuti: sed in medio eius dū humores excitātur q̃ suo incremēto: insequunt̃ icremētū qđ in substātia lunæ auget̃ crescitq̃ cerebri medulla in caluaria: aquæ quoq̃ fluminū fluctiū ac refluxiū augent̃. Diei aut̃ hora cōuenientior ad earū defixionē. est secūda & tertia: post balneū in super admoueri nō debent nisi forte quis crassum habuerit sanguinē. tūc enī debet balneo ablui deinde aliq̃tulū morari: mox cucurbitulas imponere. Maior autē pars hoīum recusant appositionē cucurbitularū i syncipite

qa p̄cipiūt & sensū & mētē ex eis offendi : sed  
 si ī caua pte occipitii adhibeātur īcisiōis uenæ  
 mediæ sup̄lēt uices. Gravitati quoq; sup̄cilioꝝ  
 rū auxiliū p̄bēt & palpebras alleuiāt ac oculoꝝ  
 scabiei orisq; fetori opitulāt : & si sup̄ scapulas  
 (cahal arab. uocāt) īfigant īcisiōis incinorinæ  
 uenæ. uicē gerūt. dolorēq; hūeri & gutturis le  
 uāt. & si sup̄ alterā duarū uēarū colli postero  
 rū īponant : p̄ cephalica ualēt : & tremorē capi  
 tis leuāt : mēbrisq; capitis cōferūt : uelut sūt faci  
 es dētes mādibulæ aures : oculi : gutt : nares. Ve  
 rū ut inqt Muhamad. Si cavitati occipitii īpor  
 nāt obliuionē īducunt : cū posterior ps cerebri  
 sit loc⁹ mēoriæ : quē cucurbitule ībecillū red  
 dūt : sed si sup̄ cahel apponāt os uētriculi debi  
 litāt : & si sup̄ uenas colli posteriores (q̄s cada  
 hin arabes uocāt) īfigāt fortasse inducēt capi  
 tis tremorē. Idcirco à cavitare occipiti parū  
 descēdere : & supra scapulā parū ascēdere licet  
 nisi forte sanguinis suffusiōi uel tussi succurre  
 re uelim⁹ : tūc. n. nō debet ascēdi sed ī suo loco  
 dimitti. Apponere aut cucurbitulas sup̄ cahal.  
 & iter hūeros sūmope ualet ad egritudines pe  
 ctoris ex sanguine pendentes : & ad sanguineā  
 cōuulsionē sanguineūq; catarrū. Verū stōachū  
 debilitat ac tremorē cordis parit : porro si cru  
 ri superponant iuuamētum simile afferunt :  
 qđ ex saphenæ sectiōe haberi solet. sāguinēq;

Al lra  
occipi  
tium

mūdicāt, mēses cient. Mulieri insup q̄ & albū  
colorē ac rarū habitū tenuēq; sanguinem hēt:  
magis expedit cucurbitularū appositio super  
crura q̄ uenæ saphenæ incisio: p̄terea si super  
uertice: ac mediā caluariā infigan̄ ad deliriū  
ac uertiginē: ut à nōnullis traditū ē: & ad tardā  
canitiē ualēt. Sed hæc sentētia nō est oīno cer  
ta: nā in aliqbus corpibus. in aliqbus uero nō  
id effici pōt: ut plurimū tñ solēt canitiē accele  
rare intellectuq; lædere. Oculor; tñ morbis au  
xilian̄. & hoc ē remediū p̄stātius qđ ex huius  
cemodi infixione cucurbitularū hēri pōt: nam  
cōfert & ipsa scabiei palpebrarū tuberculis ocu  
lorū egressiōiq; corneæ uel uueæ mēbranulæ  
uerū mētē offendit attonitū morbū obliuionē  
malas cogitatiōes morbosq; diuturnos parit:  
officit quoq; his q; suffusionē oculi patiūtur:  
nisi forte tēpus ad id faciēdū commodū se offe  
rat. nā sic fortasse ñ nocebit. Ad hæc si sub mē  
to iponant̄ dentibus. faciei: gutturiq; p̄sunt ca  
put ac maxillas mūdicāt: & si sup coxēdices:  
apponā̄ ad abscessū femoris eiusq; scabiē & tu  
bercula podagrā hemorroydas morbū elephā  
ti ad uesicā ac uteri uētositatē dorsi q; pruritū  
satis ualēt. Qđ si igne cū scarificatiōe apponā  
tur maiorē uim obtinēt ubi nō sit flatuositas:  
sed q̄ sine cōcisione imponunt̄ uehemētius fla  
tum frigidū dissoluūt eumq; in ea pte uel ubi



cūq; existentē discutiūnt. Apponere quoq; eas super femore in intrinseca parte satis profunt ad testiū abscessus ac femorū tibiariq; tubercula. Sed q̄ in posteriori femorū pte imponūtur ad abscessus q̄ in natibus orti sint ualēt & si sub flexura genu admoueant: cōferūt tremori genu ex acribus hūoribus suborto ac uitiosis abscessibus & tibiariū pedūq; putridis uulceribus. Sed q̄ sup talos ponunt: ad menstruorū retētionē & ad egritudinem coxēdicis & podagræ ualēt: sed si sine scarificatiōe apponatur: qñq; retrahūt materiā: à pte sui motus: ut cū māmīs infigūtur ad sanguinis mēstruorū profluuiū sistēdū. nōnūq; tñ apponūtur: ut a pte profundū: extra euocet: ut medicamē pueniat ad ipm. Aliqñ uero ut a pte ad aliqñ mēbrū ignobilius sua uicinitate transserat. Nonnūq; adhuc admouent: ut mēbrū calefiat: & ut materia trahat ad ipsum eius quoq; flatus uētosī discutiātur. & qñq; ut ad suū naturalē locū mēbrū redeat: à quo dimotū est: ut sit in eo morbo quo intestina in scortū dilabuntur. Apponunt quoq;: ut dolor mitigetur: quēadmodum: cum infigunt umblico ad difficilē dolorē intestini coli ac flatus uētris uētosos: uteri q; dolores: qui tpe motus mēstruorū accidere solent & prefer tim adolēcentulis. Molliori quoq; parti cruris infiguntur ad coxēdicū dolorē. Coxæ uero

ad luxationē & inter ambas coxas: si admoue-  
antur ualent ad ipsa crura & femora & mari-  
scas ad herniā patientes & podagram. Apposi-  
tio præterea cucurbitularū super podicem tra-  
hit ab uniuerso corpore & à capite & confert  
intestinis. corruptionem quoq; mēstruorum  
fanat & corpus ab ea leuatur: & ut aiūt. tria ha-  
bentur ex ea iuuamenta. Primum euacuatio:  
quæ ab ipsomet membro fit. Secūdū q̄ substā-  
tia spiritus ita remanet integra ut ad materiæ  
euacuationē. nō sequatur eius euacuatio. Ter-  
tium uero est q̄ nobilia' membra nō euacuat.  
debet tamen cutis concisio profunda esse ut  
ex petitiōibus partibus attractio fiat. Aliquan-  
do insuper intumescit locus ubi infixa est cu-  
curbitula: ita ut difficile auferatur: tunc igitur  
pannum uel spōgiam aqua tepida madidam:  
quæ potius ad caliditatē declinet accipere de-  
bes: qua circuitus loci calefiat: hoc enim sepi-  
sime euenire solet ubi cucurbitulæ super par-  
tes māmæ infiguntur ad profluuium mēstruo-  
rum ac sanguinis narium sistēdum. & ideo nō  
debent super ipsammet māmam firmari. Cū-  
q; locus ubi infiguntur unctus fuerit statim ap-  
poni debēt nec tardandum est immo cōfestim  
scarificāde sunt: prima quoq; appositio sit le-  
uis facilis euulsiois mox gradatim tardet euul-  
sionem ac moram: cui præterea cucurbitulæ

impositæ fuerint cibus post horam dādus est: puero autem qui iam tertium egerit annū cucurbitulæ infigi possunt: sed qui sexagesimū egerit annum nullo modo apponantur. Ap-  
positio præterea cucurbitularum nos tutiores facit ne materiæ ad partem inferiorem fluant. Sed si ille cui apponuntur fuerit biliosus grana malorum punicorum eorumq; aquam & intubum & sacharum lactucam acetumq; potestea assumere debet.

¶ Caput uigesimum secundum sen quartæ.  
De hirudinibus.

Sapientes indi dixerūt aliquas esse hirudines natura uenenosas & ideo dānant magna habentes capita & colorem antimonii aut uirides & habentes in dorso ueluti fila coloris cæsi: & eas: quæ alicui serpentum generi assimilantur: quoniam his omnibus inest uis uenosa pariuntq; apostemata uel animi defectum: aut sanguinis profluuium: aut febrem uel lassitudinem: aut ulcera intractabilia ac reiiciuntur: quæ in aquis cenosis uitiosisq; capte sunt sed eligi debent: quæ in aquis quibus lenticulæ supernascuntur. Nec acceptes dictum illorum: qui affirmant esse uitiosas eas hirudines quæ in aqua in qua ranæ oriuntur genitæ fuerint. Sed quod ad colorem earum attinet. præstantiores quidē sanguisugæ sūt q̄

uiridē in dorso obtinēt colorem. & hñt ueluti  
duas lineas extēsas in earū supficie colore auri  
piginēti: & q̄ sunt flauæ q̄ habēt corpa rotūda  
& q̄ sūt coloris hepatis: & q̄ similanť locustis  
paruis & caudæ muris nō absimiles: ac tenues  
pua habētes capita: nec eligātur nisi: q̄ uētre  
rubeū ac dorsū uiride hñt presertim si in aq̄s  
fluētibus iueniātur. Hirudinū p̄terea attractio:  
maior fit ex intimioribus p̄tibus q̄ q̄ p̄ cucur/  
bitulas fiat: p̄ diē quoq; ad seruādā sunt postq̄  
captæ fuerint anteq̄ admoueātur. eas quoq; i  
cōtrariā partē earū subuertere debes: ut euo/  
māt & qcqd in uētre cōtinent si possibile fue/  
rit egrediatur: Mox exiguo sanguine agnellī  
aut alterius id genus respergēdæ atq; alendæ  
sunt anteaq̄ adhibeāť: deīde capiāť & spōgia  
mucore & sordibus repurgādæ sūt: ea p̄terea  
pars cui admouēde sūt. debet prius nitro abluī  
frictioneq; rubescere: postea uero cū eas ipone  
re uolueris demergātur in aq̄ dulci & expur//  
gētur deinde defigātur: facit p̄terea eas auidi⁹  
adherere si locus priō luto uel sanguine linia/  
tur. Cūq; iā repletæ fuerint & eas excidere desi/  
deras: tūc sale aut cinere uel nitro: aut liteolo  
usto aut cremata spōgia uel lana aspergatur &  
excidēt. Sati⁹ aut ē postq̄ exciderint: cucurbi/  
tulis aliqd sanguinis illius p̄tis exhaurire: quo  
nocumētū ex morſu earū ipressum extrahāť:  
cæterū

cæterę si sanguis emanare nō desinat: gallæ cō  
bustæ ei pti iponāt: aut calx: aut cinis aut mir  
tus tenuissime cōtritū: aut aliqd aliud id gñs,  
q̄ sāguinē supprimūt: q̄ oīa habeat parata: qñ  
eas admouet. Cōfert aut sanguisugarū apposi  
tio: morbis subcutaneis ut serpigini impetigi  
ni & his similibus.

¶ Caput. 23. fen quartæ. Quibus nā remediis  
euacuationes astringantur.

**V**Acuatio qđe astringit: uel auertēdo mate  
riā citra eūationē: uel euacuādo cū auer  
sioe quoq; uel adiuuādo ipsammet eūationē:  
aut medicaminib⁹ refrigerātib⁹: cōstipātibus:  
aut glutinātibus: uel urētibus: uel deligatura.  
Astringimus aut eūationē p reuulsionem sine  
eūatione ut si sanguis ab utero pfluxerit & eū  
retinere uolueris: cucurbitulas sup māmā de  
figes. Melior tñ diuersio ē: q̄ dolor p̄ticulæ à q̄  
reuellit sedat: ea uero reuulsio: q̄ fit cū eūatio  
ne est: q̄ p sectionē uenæ iocinorinæ fit: & ue  
lut astrictio uomitus p alui solutionē: & hæc p  
uomitū: & utrūq; ipsorū p sudorē. Astrictio ad  
huc fit: auxiliādo eūationi: ut cū uētriculū & i  
testina ex hūoribus glutinosi lubricū lapsū fa  
ciētib⁹: hiera purgamus: uētriculiq; osculū uo  
mitu expurgare cogimur: ut materia: q̄ uomi  
tū iā firmatū efficit abscondat. Medicamenta  
quoq; frigida id efficiūt: q̄a qđ frigidū ē cōge

lant: osculaq; stupida faciunt: eaq; angustiora reddūt. Medicamēta autē stiptica ideo id faciūt q̄a materiā cōprimūt meatusq; slipāt: sed glutinatiua medicamina: p̄pea q̄ in osculis meatuū obstructionē pariunt: q̄ si calida exiccātia q; fuerint, fortius id efficiēt. Medicamīa uero crustā generātia. ideo id efficiunt: q̄a ea crusta sup ipsū meatū uelut operculū manet & claudit. eumq; stricte herere facit. uerū affert secundū piculū: ne scilicet crusta decidat: & latior reddat meatus, Sunt præterea aliqua incrustātia: quæ astrictiua facultatē hñt: ut Myfi: aliqua uero nō: ut calx nō extincta: ubi autē crustā diutius herere desyderamus. astringentibus crustificis tunc utimur. Aliis uero ubi citius crustā excidere cupimus: fit adhuc retētio p̄ ligaturam: partim claudēdo meatum & ut omni conatu si opus sit claudatur ueluti ligamus cubitum: ubi medicus p̄ errorē arteriam p̄ uena iecoris secuerit: p̄ti replēdo ora uulneris. re. uiā claudēte: q̄ uacuatio fit: ut si repleat̄ osculū uulneris pilis leporis dicim⁹ igit̄ q̄ si sāguis p̄fluuiū ex reclusiōe orificioꝝ uenarū fiat: utiq; medicamētis astrigētib⁹ op⁹ ē. ac oscula earū cōprimeꝝ At si ex eruptiōe id fiat: tūc astrigētibus simul & glutinātib⁹ opus ē ueluti terra lēnia. Qd̄ si ex erosiōe p̄fluuiū accidat: his q̄ carnē gignūt mixtis cum detergentibus mederi debet.

¶ Cap. 24. fen quartæ. Quo nã pacto obstru-  
ctiões curari debeant.

**O**bstuções qđe fiunt uel ab hūore cras-  
so: uel ex lētis hūorib⁹ aut multis: qđ si ex  
multis fiāt hūoribus: nulla alia cōcurrente cā:  
tūc ad auferēdā eorū læsionē satis erit: uel san-  
guinis missione uel purgatione eos educere:  
at si ex crassus: tūc medicamīa dissoluētia: qđ ab-  
stergūt administrari oportet. Si uero glutino-  
si fuerint humores & p̄cipue tenuēs: tūc incidē-  
tia medicamīa necessaria sunt: nec te lateat qđ  
inter sit inter crassū & lētū. Differūt. n. inter se  
se uel ut lutū & gluten liqdū. Crassū. n. dissol-  
uētib⁹ eget ut attenuet & facile expellat: gluti-  
nosū uero incidētibus: ut inter ipsum & id cui  
adheret sepatio fiat. ut ab eo expurget & eius  
ptes incidant: nā glutinosū suo lēto: ac suarū  
ptiū adherētia: obstructiōē parit. In dissoluē-  
do p̄terea crasso: duo cōtraria sunt obseruāda  
alterū. s. ne fiat resolutio ita imbecillis ut rarita-  
tem materie: eiusq; molem augeat. Citra reso-  
lutionem: augendo adhuc opilationem. Alte-  
rū uero ne ualida fiat resolutio. Cuius tenuis  
portio in uapores: crassa uero ī lapidē uertat.  
Cūq; ualida idigebis dissolutiōe adiuua eā: le-  
ui mollificatione: qđ fiat medicamine non cras-  
so: hñte calorē moderatū: ut ualeat p̄cit⁹ dissol-  
ueri: id qđ facit oppilationē. Inter obstructiōes



præterea: difficilius quod est: quam in uenis fit: deterior autem hac: quam in arteriis: deterior adhuc est: quam in principibus partibus fit. Ad hæc medicaminibus recludentibus satius quod est admiscere aliquid uim astringentiam & attenuantiam habens: quam illud astringentium: grauitatem attenuantis corrigit.

Caput. 25. sen quartum. De cura abscessuum.

**A** Postematū: quodā sunt calida: quodā frigida mollia quodā frigida dura: quod iam a nobis numerata sunt. Eorum autem causæ: uel sunt extrinsecæ. uel præcedentes: intelligo autem præcedentes ueluti plenitudinem: per exteriores uero: ut uulnus: casus: ictus: ac morsus: porro quod ex causis exteris fit uel cum corporis plethoria: uel cum humorum moderantia accidit. Si cum corporis plethoria antecedentes & exteriores cause concurrant perfecto uel in uicinis partibus ipsis principibus membris ad quos fit transmissio: id fiet. uel non. quod si non: tunc in principio nihil resolues eis admoueri debet. sed membrum impellens: si adsit: corrigi debet uel uniuersum corpus corrigat. Si humorum aqua: non habuerit singulare membrum: admouendo ei quodcumque repellat: & ad oppositam partem retrahat & astringat. Et fortasse fiet tractio ad oppositam partem illius membri locati in parte opposita: per dimotionem aut si aliquid graue pondus ferat. nam sepiissime trahit materia a manu in quam est abscessus: si altera: aliquid graue pondus ferat per horamque illud retineatur. Ea uero: quod

Al. lra  
ut

uim astrictiuā hñt: in calidis qđē apatibus de/  
 bēt esse: exq̄site frigida. Sed in frigidis: mixta  
 his. q̄ uim obtinēt & calidā & astrictiuā: ut est  
 spheniāthos, & unguis odoratus: seu cōcula i/  
 dica (quā blactā bifantiā uocat). Accedēte aut  
 maturatiōe: minus astrictiua applicabis: q̄bus  
 dissoluētia admiscebis: donec puenierit ad ui/  
 gorē. tūc. n. eqs portiōibus mīsceri debēt. Sed  
 dū īclinat resoluētibus & mollientibus uti sat  
 erit. ea uero q̄ frīda ac mollia dissoluūt apata  
 uī exiccatiuā ac aridā hēre debēt: q̄ qđē uis pl⁹  
 ī calidis repiri solet. At apata q̄ ab exteriori cā  
 ortū hñt: nec ulla adest hūorū repletio: debent  
 oīno ī prīcipio: molliētib⁹ & resoluētibus cu/  
 rari. Sed nō eo mō: quo curasti primū genus.  
 Ver⁹ si illud mēbrū: qđ apate laborat: fuerit ue/  
 luti excretoriū alic⁹ prīcipis: ut sūt loca adeno/  
 sa colli & apđ aures ipsi⁹ qđē cerebri. ascelle ue/  
 ro cordis: iguinaq; hepatis: tūc nullo pacto de/  
 bet eis applicari: qđ repellat: nō q̄si hęc nō sūt  
 uera curādi ratio eorū apatū: imo hoc est uere  
 p̄sens remediū illorū apatum. Sed nolumus ea  
 apata sanare: immo cupimus ea augere mate/  
 riāq; ad ea trahere: nec timemus addere læsio/  
 nē illi p̄ticulæ cū prīcipi opitulari q̄ramus: nā  
 si materiā reuelleremus: nūq̄ sine formidie ef/  
 femus: qn materia ad nobile mēbrū pueniret  
 uñ irrepabile subsequet̄ īcōmodū, nā nos p̄eli

gimus mēbrū lēdi ignobile: ubi nobili succu-  
 ratur. Immo nos studemus trahere materiam  
 ad membrum ignobile: & ut in eo apostema  
 oriatur: siue cucurbitulis siue emplastris cali-  
 dis: uim attractiuam habentibus. Et cum hæc  
 uel alia apostemata suppurantur: & presertim  
 quæ sunt in locis cauis: fortasse sponte: uel au-  
 xilio maturatiuorum remediorum disrumpē-  
 tur: & fortasse maturare ac rumpere simul co-  
 nabimur. Maturatio autem perficitur his quæ  
 oppilatiuam ac glutinatiuam habent uim ad-  
 ditam calefactoriæ: quibus ipse calor retinea-  
 tur. At si quis huiusmodi maturatiuis reme-  
 diis uti uoluerit: debet animaduvertere: utrum  
 calor innatus sit imbecillus & membrum ten-  
 dat ad corruptionem: tunc enim ea quæ uim  
 habent oppilatiuam & glutinatiuam am-  
 mouere debet: & uti aperitiuis ac profūda sca-  
 rificatione: mox resolutiuis & exiccatiuis: ut  
 adhuc in particularibus libris: sermo nobis cō-  
 plebitur. Sepe præterea apostema est profun-  
 dum: ita ut cogamur trahere ipsum ad partē  
 cutis etiam cucurbitulis ignitis. At i duris apo-  
 stematibus quæ terminum uigoris transierint  
 conueniens remedium ac regula est: uti molli-  
 ficantibus remediis: quandoq; his quæ parum  
 calefaciant & exiccent: ne præ nimia dissolu-  
 tione: quod crassius est duritiem lapidis asse-

quatur. Immo id totum dissolutioni paretur: mox dissolutio augeatur. Quod si postea ueraris: ne ex dissolutiōe, quod residuum est: in lapidem uertatur: reuertere iterum ad mollificantia: & sic iugiter procedas donec partim mollificando: partim dissoluendo uniuersum apostema cōsumes. Apostemata uero tumida (quæ oedemata uocantur) curantur medicaminibus habentibus uim calefactoriam: cum tenui substantia: ut flatus dissoluatur: meatusq; exigui dilatentur: nam horum apostematum tumidorū causa est: crassus flatus ac meatuum obstructio. Oportet adhuc studere: ut amoueatur: ea materia: quæ uaporem gignit flatuosum. Sunt præterea nonnulla apostemata ulcerosa: ut fornicia deambulatoria: quæ quidem remedia refrigerantia exposcunt. eiusdē gñis sunt apostemata inflāmata (q̄ phlegmone uocāt) At nō debēt hūectari: & si ipsi apati deberet humectatio. Immo exiccent. Qm̄ in his: Accidēs uicit iā cām. Est aut accēs ipsum ulcus qđ affutur: timetur: uel quod iam accidit. Vlceri enim cura exiccatiua debetur: cui nihil noxium magis ipsa humectatione. In intrinsecis uero apostematibus: debet materia minui per uene sectionē & purgatiuū medicamē. Debet et q̄ apatibus hisce uexāt balneū uinūq; & mot⁹ corpeos ac aiales imodicos ut est iracun



dia & id genus alia euitare. Deinde inter initia  
 debet uti his: q̄ sine molestia repellere ualeant  
 p̄sertim si id mēbrū fuerit q̄le est uētricus: &  
 iecur: tpe aut̄ quo dissoluētia remedia: cōueni  
 unt: nō debēt deesse tibi stiptica odora: ut i p̄ce  
 dētibus sermōibus: iā te admonuimus: & iecur  
 atq; uētricus inter cætera mēbra: his stipticis  
 magis q̄ pulmo idigēt. Ea uero remedia: qbus  
 utimur, ut aluū leniāt: debēt eē medicamīa: q̄  
 uim maturādi & cū ipsis ap̄atibus cōuenientiā  
 obtinēt ut hortense solanū & cassia fistula. Va  
 let aut̄ ipm solanū, ex pp̄ria natura, ad dissol  
 uēda calida ap̄ata intrinseca, & q̄ his laborāt ab  
 scessibus, nō debēt uti nisi tenui uictu, & dū ac  
 cessio nō adsit, si accessionē habuerit, neq; iter  
 initia, nisi forte urgēte uehementi ibecillitate.  
 Et q̄ ap̄a uiscerū sīl cū defectu uiriū patiat̄ is  
 ad iteritū accedit cū uires, cibo tātū excitent̄ ni  
 hil at̄ magis lædit q̄ cib⁹. Qd̄ si ap̄ata dissoluā  
 tur, bñ ē. Sed si disrūpant̄, tunc q̄ detergāt bibi  
 debēt, ut aq̄ mulsa, & aq̄ ex sacharo, mox, quæ  
 sensim maturēt, cū his q̄ uim exiccādi hñt assu  
 mi debēt. Tādē q̄ exiccēt satis erūt. Sed hæc ex  
 acte cognosces ex libro, q̄ ptiales cōtinet mor  
 bos. In ap̄atib⁹ p̄terea internis, q̄ sub. uētre exi  
 stūt, cōmittit̄ error, cū forte non sint ap̄ata sed  
 roptura, & tūc eorū aptio erit timorosa uel for  
 tasse erit ap̄a internū, qd̄ nō ē in pitoneo, sed i

ipsomet intestino, & tunc apertio eorum non sine discrimine erit.

¶ Caput. 26. sen q̄rte. De Ap̄atum ap̄tione.

**S**I qs aliquē abscessū ap̄ire uoluerit debet scissura: rugas illius mēbri imitari: nisi id mēbrū fuerit frons uel aliud simile. Nā si ī eo scissura secūdū rugas fieret, icideret musculos frōtis: & sup̄ciliū caderet. Verū ī mēbris ī qb̄: ruge cōtra ordinē uilloꝝ musculi p̄cedūt contrariū fiat. Debet igit̄ q̄ icidit: scire artē secādi neruos: ac uenas & arterias, ne oberret & aliq̄d hoꝝ incidat: & medicamēta sanguinem ad stringētia apud se p̄ata hēre ac emplastra dolorē mitigātia: & inst̄ia ad id idonea: hēatq; secū aliq; ut sūt medicamēta Galeni: & uelut pilos leporis & telas (seu stamina) aranei & albū ouis: & urētia oīa phibēt sanguis fluxū si accidat: siue ex errore siue ui ad id inductus qs fuerit: & hēat penes se medicamina molliētia. Et cū ap̄itur abscessus & extrahit̄: id qđ itus erat: nō debet admoueri ei: oleū neq; aq; neq; linimentū in quo sit oleū: uel seuū abūdās ut ē unguentū basilicon sed debet apponi uelut linimentū ex chalcitide: qđ fiat cū eo idigēus: & supra ip̄m iponat spōgiā madefactā ex uino austero.

¶ Caput. 27. sen quartæ. De membri corrupti curatione eiusq; sectione.

**C**VM aliquđ mēbrū corruptū ob aliquā malā tpaturā in eo existentē: cū materia uel

sine materia: & non suffecerit scarificare: aut si  
 nire his quæ ipsum corrigant de quibus facta  
 est mentio in libris particularibus: tunc caro cor  
 rupta que in eo est omnino auferatur & satius est  
 id sine ferro fieri quatenus datur: quoniam ferrum si  
 fortasse tetigerit musculorum fibras & arterias  
 lædet eas. Sed si id non sufficiat: & corruptio  
 iam deuenerit ad carnem: tunc necesse est ipsum  
 secare: & locum sectionis oleo feruente urere. Sic  
 enim à uehementia malitiæ eius nos tutiores red  
 dit: fluxusque abscindetur: ac super locum scissum  
 caro & cutis aduentitia dissimilis: simillima tamen  
 sua duritie. ipsi carni oriatur. Et cum deueneris  
 ad incisionem: debes intrromittere stylum: quo  
 fit tentamentum: & in circuitu ossis ipsum circum  
 ducere dum inuenias sanam unionem (nam ubi  
 dolor augetur ex styli ductu) inibi quidam sanitas  
 terminatur: sed si locus ille relaxatus fue  
 rit & eius unio imbecillis: tunc illud secari de  
 bet. Quandoque præterea perforabis id quod  
 circumdat os: quod secare cupis: ita ut tere  
 bellis circumdetur & rumpatur seretur ue. Quã  
 doque uero serra ferrabis. At cum id efficere uo  
 lueris: fac ut intermediet: aliquid inter instrum  
 entum quo inciditur terebellum ue & ipsam  
 carnem: ne dolorem afferant.

Al. Iſa Et si super os quod secare intendis fuerit ueluti  
 rami uel arterie prominentes non herentes inter se nec  
 frustra speretur eas in rectam habitudinem reduci posse,



Immo timeas ne id quod in eius circuitu est corrūpatur: tūc caro debet ab eo remoueri uel scissione uel deligatura aut extēfione: ducēdo ad oppositā partē uel aliqua alia industria: ad quā ipse uisus te diriget: & si ibi aliquod mēbrum nobile adfuerit: tūc inter ipsum & illud os aliquid intercipi curabis: uelut septis: ex frustis pānorū: ut his ab eo distet deīde seca. At si huiuscemodi os fuerit: uelut os coxe & magnū musculis Arteriis uenisq; proximū: eius quorq; corruptio immodica: tūc medicus debet ab eo negocio se abstinere.

¶ Caput. 28. sen q̄rtæ. De curatione solutiōis unionis ac ulcerum generum.

**C**ontinuitatis solutio magnorū quidem mēbrorū: æquatione & cōueniēti deligatione: quæ in arte ligādarū fractionū dicta sūt & adhuc suo loco tibi dicet̃ curat̃. Mox q̄te uictuq; glutinatio ex quo callum seu porum carnosum gigni sperabis: & utrāq; partem fracture maxima hesione unire facias & superponas bracteas quas super unionem partium uasis ærei: fabri ærarii: solent apponere labiaq; fracture ui astringas atq; impleas: nam falsum est posse coalescere os: præsertim in etate adulta nisi hac ratione: quoniā non potest ullo pacto conglutinari. De curatione tamen fracturæ adhuc faciemus completum sermonem in singularibus tractationibus.

Curatio uero solutionis cōtinui: q̄ i mollibus  
 cōtingit mēbris tres cōplectif itētioēs: si cā fue  
 rit fortis. Priā ē abscidēre id qđ pfluit: sistereq;  
 materiā eius si festinet ut noceat. Secunda est  
 scissionē unire medicaminib⁹ ac cibis cōgruis.  
 Tertia uero ē putredinē phibere: quo ad fieri  
 pōt: qđ si his tribus unū desit. īspice reliq̄ duo.  
 Quot aut modis sistat id qđ pfluit iam nosti.  
 Vnio uero fit cogēdo in unū labra ulceris: si in  
 unū duci possint exiccātibusq; ac glutinātiū as  
 sūptioē. Nec te lateat intētioē curatiua ulcē  
 eē ipsam exiccationē. Qđ si ulcus fuerit purū  
 exicceť tātū: sed si putridū adhibeant medicā  
 mēta acria corrodētia ut ex chalcitide & mysi  
 & arsenico & calce & si nō ualeāt: tūc necesse ē  
 deuenire ad ignē. Medicamētū aut qđ ex flore  
 æris & cera & oleo cōficiť moderatum ē i hoc  
 negocio. flore enī æris mūdificat oleo uero &  
 cēra mordicatio īmodica tollit. Dico adhuc  
 qđ oē ulcus necessario. est. uel solū & ipsū p se:  
 aut cōpositū. Solū aut si exigūū fuerit nihilq; i  
 eius medio erosum fuerit: tūc eius labra debēt  
 uniri: ipsūq; fascia inuolui: cū maxia tñaiad/  
 sione ne aliqd olei inter ipsa labra intercipiāt  
 aut pulueris inspēat. Hęc. n. phibēt ipa uniri.  
 Idētidē fieri cōuenit in magno ulcere cui⁹ sub  
 stātiā nihil desit & partes: altera alteri cōiūgi  
 possint. At ulcus magnū qđ non pōt uniri siue  
 id fuerit scissura aut capacitas: plena sanie ex q̄

aliqd substātiæ ipsi⁹ mēbri depditū fuerit: ei⁹  
 qđ curatio ē exiccatio. Sed si id depditū: cutis  
 fuerit sola: tūc qđ cutē obducatur exposcit & id  
 qđ uel p se: & tūc astringētibus: aut p accidēs:  
 & tūc calidis uti oportet. pag. tñ. sitq; id usū ex  
 mysi: & chalcitide. Hæc. n. magis faciūt ad exic  
 cationē & magis crustā gignūt. Qđ si imodica  
 hæc eēt corroderēt: ulcusq; augerēt. At si qđ  
 depditū ē: fuerit caro sola: ut i ulceribus pfun  
 dis: nō festines cicatricē obducere. Immo priō  
 debes i generāda carne studere. Gignūt at car  
 nē: q̄ primū ordinē exiccādi nō multū trāsgre  
 diunt: sed circa hoc: qđā cōtēplari prius opor  
 tet: primū tēperamētū radicale ipsius p̄iculæ  
 tēperamētūq; ulceris. Nā si illud mēbrū fuerit  
 tēperaturæ ualde humidæ ulcus uero nō. Tūc  
 exigua exiccatio in primo uidelicet ordine sat  
 erit: qm̄ morbus ipse: nō multū distat à natura  
 mēbri. Sed si mēbrū fuerit siccū & ulcus uehe  
 mēter hūidū. tunc q̄ in secūdo & tertio ordine  
 exiccāt sunt necessaria: ut sue tēperature resti  
 tuat. In tēperatis uero tempata sunt oppor  
 tuna. Ad hæc & uniuerſi corpis tēperamētum  
 inspicere oportet. Quoniā si corpus imodice  
 siccū fuerit: & illud mēbrū qđ ē auctū i hūidita  
 te fuerit tēperate humiditatis in cōparatiōe ad  
 corpus tēperatum: tunc debet æqliter exiccari  
 itidē si corpus fuerit i humido auctū: & mēbrū  
 declinet ad siccitatē. Sed si simul in excessum

agrediatur: uel egressio fiet ad humiditatem: tunc maior exiccatio conuenit: & si ad siccitatem minor exiccatio est necessaria. porro ipsius medicaminis exiccatiui facultatem contemplari oportet: nam licet exiccantia medicamenta que generant carnem non adhibeantur: ut exiccatione ita ualida efficiantur: que prohibeat materia effusa: que est apta carnem in membro generare: ut ea que ad generandam carnem non sunt adinueta sed ad obducendam cutem. desiderantur tamen ut magis detergant & abluantur: que que exiccant: & que quidem ut sigillent & coagulent admoventur: & omnia medicamina que citra mordicationem exiccant: inter carnem producantia ascribuntur. Quoniam omne ulcus in loco non carnosum: non est aptum cito sanari. Idem neque orbiculare.

In medicaminibus propterea exiccantibus & astringentibus: que ad curationem ulcerum iterum admittantur: debent admisceri: que detergant: ut mel: ac ea que propria respiciunt particulam: uelut que urinam cient ubi in istorum urina accommodatorum ulcera curare tentamus: sed cum cicatricem ducere cupimus: tunc medicaminibus utimur: que cum sua astrictione habeant adhuc exicare & coagulare: ut est terra lenia: (quam sigillatam uocant.) Scias adhuc quod multa sunt que ulcerum sanari prohibent: ut est membri iteperies: idcirco oportet eius correctioni studere. Mala quoque sanguinis temperatura: que ad ipsum uadit idem prohibet. Quare his que optimum humore gignunt corrigi debet. Multitudo adhuc sanguinis que ad illud

fluit ipsūq; hūectat: id quoq; efficit: cui succur  
rēdū ē eūatione: & uictus attenuatiōe deābula  
tiōeq; si fieri p̄t. Ad hęc offis ei subiaccētis corru  
ptio: idē facit emittēdo sanie: qđ qđē uitii nū  
lū hēt remedium: nisi rectificatione illius offis  
eiusq; abrasioe si fieri p̄t: ut abrasio corruptio  
nē tollat, Ablationeq; atq; sectiōe. sepissime p̄  
terea cogit q̄ ulcera sanat: ut ferat apud se em  
plastrā trahētia offis fragmēta: habeatq; instru  
mēta: qbus ea educat: alias. n. ulcus sanari im  
pedirēt: porro ulcera cibo indigēt ut opitule  
eis sed eius minutione: ad abscondēda materiā  
saniei. Verū he due necessitates: inter se differ  
rūt: qm̄ sanies uires debilitat p̄p̄ea roboratiōe  
indigēt: at ubi multiplicat̄ inedia indiget: quo  
circa medic⁹ debet ēē h⁹ negocii rector. Cūq;  
ulc⁹ fuerit ī prīcipio & īcrem̄to n̄ debet balneū  
igredi: nec aquā calidā tāgere: qm̄ traheret ad  
ipsū qđ āpa augeret. at si iā ulc⁹ q̄uerit & sāies  
gēita fuerit: tū forte id licebit. Oē p̄terea ulc⁹:  
qđ citi⁹ iusto claudit dū ī sup̄ma pte p̄solidat̄:  
ē ī uia ad cārenā. īspiceī igit op⁹ sp̄ saniei la  
brorūq; ulceris colorē: qđ si sanies mltiplicet  
nō multiplicato cibo: illud ē ipsa maturatio.  
Nūc uero de curatiōe rupture differam⁹ & di  
cam⁹: q̄ cū ruptura sit solutio cōtinuitatis p̄fū  
da sub cute iccirco ualētiora medicamēta req̄  
rit. q̄ q̄ ī sūmo corpe existit: sed qm̄ sāguis uber  
rime cōfluit ad eā: iccirco dissoluenti indiget

medicamina qđ qđe nō debet imodice sicari  
 nē tenue dissoluat & crassū ī lapidē cōuertat:  
 factō at offō ipsi⁹ dissoluētis:glutinatoriū usus  
 necessari⁹ ē:ne sordes medie ulceris coitū īpe/  
 diāt:& ī lapidē cōuertat:mox q̄libet leui de cā  
 putrescāt:uel euellāt:& solutio cōtinuitatis re/  
 deat.At si ruptura p̄fūdior fuerit:debet p̄ticu/  
 la īpā scarificari:ut medicamē magis penetret.  
 Ruptiōi p̄terea cū leui fractione fortasse uenæ  
 sectio p̄ cura satis erit.At si ruptio cōtusiōi ad/  
 iūcta fuerit:tūc cōtusio debet curari medicami/  
 nib⁹ cōtusiōi idōeis.& si cōtusio fuerit magna  
 curet exiccātib⁹:& si exigua uelut pūctura ac⁹  
 tūc eā nāc cōmittemus nisi fuerit uenefica īte/  
 rimēs:uel magno cruciatu dolorē afferēs:aut  
 tetigerit neruū:uñ apā & pulsū oriri uereamur  
 In fractura uero ossiū sufficit leuis deligatura  
 nō dolorosa:& supponere medicamēta ad fra/  
 cturas p̄pā.In casu uero uel ictu uel aliis id ge/  
 nus:necessaria ē uenæ aptio ī cōtraria pte scā/  
 uictusq; tenuitas carniū euitatio:& id genus  
 alia:linimētis quoq; ac potiōibus ad id iā ī p̄ti/  
 cularib⁹ cōmētariis iscriptis uti par ē. De solu/  
 ta at p̄tinuitate q̄ mēbris nerueis ac ossib⁹ acci/  
 dit postea fiet s̄mo ubi cū p̄ticularib⁹ reb⁹ tra/  
 ctabit. ¶ Caput.29.sen quartæ.De uestione.

**V**stio quā cauteriū uocat:ē efficacissimū:  
 remediū qđ ualet ad phibēdum expāsiō/  
 nem

nē corruptiōis & p̄ticulā cui⁹ itēperiē currigerē  
 cupim⁹. roborādā. māsq; corruptas mēbro īfi  
 xas dissoluēdas. Sāguīsq; p̄fluuiū supprimēdū  
 Inter metalica at̄ īstrā ignita. q̄b⁹ adustio fit  
 p̄stātī⁹ ē aurū: loc⁹ aut̄ ubi cauteriū fieri debet  
 uel sensib⁹ dephēdiť. ita ut ustio māifeste appa  
 reat ubi nā fiat. uel loc⁹ is p̄fūdus erit itra imā  
 p̄tē alic⁹ mēbri situs: ut ē nasus & os & podex  
 & id ḡns alia: ubi oportebitaliq; formula uelu  
 ti uagiā uti. supra quā īclineť: ut ē illud ḡns ter  
 ræ samīæ (q̄ Aster uocat) & ab arabibus talk,  
 & ut ḡns illđ chimolæ terræ: q̄ rubrica ē: uul  
 go sinopide (& ab arabib⁹ magra dī) hęc igiť  
 debet aceto p̄fūdi: mox pāno iuolui & aq̄ rosa  
 cea aut aliq̄b⁹ succis īfrigidari. illaq; formula ī  
 illū meatū: ītroducāť. ita ut locū urēdū ābeat:  
 deīde ferramētū ignitū ītromittāť: ut locū p̄ti  
 gat & nō ledat qđ ī circuitu ei⁹ existit: p̄sertim  
 si ferramētū illud urēs tenuius fuerit: cavitare  
 formule: ne ei⁹ formule latera īterna cōtigat:  
 caueat p̄terea q̄ urit ne ferramēto illo ignito:  
 usq; ad neruos: & tēdines ac copulas p̄trāseat.  
 Qđ si ustio ad sanguinē sīstēdū fiat: tūc ualidi  
 or eē debet ut crusta: q̄ gignit p̄fūdior ac cras  
 or sit: nec cito decidat: nā ubi sanguis p̄fluat: si  
 crusta ceciderit. mai⁹ īferret nocumētū q̄ pri⁹.  
 At si ad tollēdā carnē corruptā ustionē feceris  
 & terminū īcolumē dephēdere uelis. Scias eū  
 eē ubi adest dolor. Et fortasse cogeris una cum  
 h



carne os: qđ sub carne existit uter: & uestionē ifi  
gere. dōec tota ei<sup>9</sup> corruptio tollat. Si uero id  
qđ urit: fuerit ut caluaria. tūc caue ne cerebrū  
ferueat: et ne mēbranæ ipsæ conuellantur. ali  
as uero non uerearis integre urere.

¶ Caput. 30. fen qrtæ. De doloꝝ mitigatiōe.

**C**Ausas doloꝝ sub duplici gñe cōtineri: uī  
delicet subita t̃pature mutatiōe. solutiōe  
q; cōtinuitatis, iā nosti: nec te latet has diuīso  
nes tādē deduci uel ad malā t̃paturā calidā uē  
fridā uel siccā sine mā: aut cū materia hūorosa  
aut flatuoso spū: aut a p̃ate: mitigat igit̃ dolor  
his q; cōtraria sūt illis causis: quo aut̃ pacto fiat  
cōtrarietas. cuiq; earū: et nosti. didicisti p̃terea  
q̃l̃r curet̃ mala t̃patura ac a p̃a: ois adhuc do  
lor q; ualidior sit: iter facit qđ ac p̃rio corpi frī  
ditatē rigorēq; affert. mox minor reddit̃ pul  
sus: deinde penit<sup>9</sup> amittit̃. postremo tādē mori  
tur eger: porro qcqd dolorē mitigat: uel t̃pā  
turā imutat uel materiā dissoluit aut sensū stu  
pidū reddit: ea uero q; molliūt iter facile dolo  
rē solutiōe locat̃: ut anethū & lini semē & fru  
la cāpanica (q; melilotus uocat̃) & anthemis (q;  
chamemeleon uocat̃) & apii semen. Amigda  
leq; amare: & q̃cūq; p̃rio ordine sunt calida: &  
p̃sertim q; aliquā glutinatiuā uī hñt uelut gū  
mi qđ arbor prunoz resudat: & amylū. & gñā  
ceruse: & crocū: & ladanū: althea: amomū: &  
brassica. Rapū eorūq; decoctū: adipēs: & hyso

pi ceratū (qđ hūida hyſop<sup>9</sup> uocat) ac olea q̄ i  
lib. cōpōnū medicaminū tradita nob ſūt: ac ſo  
lutiua & purgatiua medicamīa q̄cūq; fuerit h<sup>9</sup>  
ſūt gñis. porro ea q̄ mollificāt: đbēt p<sup>9</sup> eūones  
admiſtrari: ſi eūatio cōuenerit itidē & q̄ apata  
maturāt uel apiūt. Inter uehemēter ſoporati  
ua primū ē ſucc<sup>9</sup> papaueris: ſeu meconion (qđ  
opiū uocat) & mādragoras radicūq; ipſi<sup>9</sup> corti  
ces. & papauer: hyos cyam<sup>9</sup>: & cicuta: & ſolanū  
ſónifer: lactuca: & ex horū ſūma ē nix & aq̄ fri  
gida. Sepiſſime p̄terea cōmittit̄ error i dolori  
b<sup>9</sup> q̄ ab extriſecis cānt̄: ut a calore uel frigidita  
te: aut eminētia puluinariū: aut icōmod<sup>9</sup> decu  
bit<sup>9</sup> aut caſus dū ebri<sup>9</sup> ē & alia ſiſia quorū cā in  
triſec<sup>9</sup> q̄rit̄: & ſic delinq̄t̄: q̄pp oportet id nō  
ignorari: nec latere utq; adſit plethoria nec ne:  
& ſciat̄ utrū adſint cāe ipſi<sup>9</sup> plethorie iā note.  
Et fortaiſſe cā extriſecus pueniet: & iā intriſec<sup>9</sup>  
ipreſſerit: uelut q̄ aquā biberit frigidā: uñ ue  
hemēs oriet̄ dolor i p̄tib<sup>9</sup> uētriculi atq; iecino  
ris. Et inultotiēs eſt neceſſaria aliq̄ magna eūa  
tio uel aliqd aliud magnū p̄ſidiū: qñq; tñ ſuffi  
cit balneatio & magn<sup>9</sup> ſón<sup>9</sup>. ut ſi q̄s aſſūpſerit  
aliqđ calidū uñ dolor uehemēti caput cruciet̄  
cui tñ potio aq̄ frigidiffime ſufficiens remedi  
um erit: fortaiſſe tamen id quo ſperamus dolo  
rem remouere: tarde imprimi ſuā actionē ita  
ut eger nō poſſit dolorē ferre uſq; ad illđ tps.  
ut ē eūatio māx̄ itēt̄ i uillis iſteſtiōrū efficiētis

dolorē itestini colic: aut erit uelocis ipsiōis: sed  
maxie ledēs: ut ē soporatio illata i p̄ticulā do/  
lore colico affectā: medicamib⁹ id faciētib⁹. ita  
ut medic⁹ de hoc negocio maxie erit p̄plexus.  
Iccirco efficacissima cōiectura p̄dit⁹ eē debet:  
ut cognoscat qđ nā hor⁹ duor⁹ tēpor⁹ diutius  
p̄durare possit: u3 uel uiriū uel doloris cōstā/  
tia: ac uter nam hor⁹ affectuū magis ledet: u3  
dolor ne: an nocumētū: qđ ex soporificatione  
oriri suspicamur: ut qđ p̄ueniēt⁹ ē p̄ponat: for  
te. n. si dolor remāserit interimet suo uigore  
& magnitudie. Sed stupor fortasse nō iterfecit/  
et: q̄uis alias ledat. Immo fortasse poteris eius  
nocumētū corrigere: & iteꝝ medicamine cōde  
cēti poterit curari. Ver⁹ cōstitutionē soporifici  
medicaminis eiusq; q̄litate īspicere oportet. ut  
leuiori utamur: illudq; cum suo correctiuo re  
medio (qđ antidotū uocāt) cōponemus: nisi af  
fectus ita eēt uehemēs: ut maxima idigeret stu  
piditate: u3 forte p̄ticula illa affecta nihil time  
bit stupefactionē. si ī ea admistret: q̄a n̄ īferet  
inde maximū nocumētū ut stupefactiuū medi/  
camē admoueat: uel forte erit tuta potio me/  
dicaminis stupefactiui. ut sit ī dolore oculi. nā  
minus hēc ledit oculum: q̄ linire ipm. Et forte  
poterit facile corrigi nocumētū p̄ueniēs ex po  
tatiōe illi⁹ ī aliis mēbris: At ī dolore coli itesti/  
ni: crescit læsio: qm̄ materia augebit frigiditatē  
& cōgelationē ac duritiē. Medicamina p̄terea

stupefaciētia qñq; mitigāt dolorē ppea q; dor/  
 mire faciūt: nā sōnus iter cās doloris mitigati  
 uas refert: p̄serti si secū inedia associet i dolor  
 mālī: stupefactiua uero cōposita quoq; uis me/  
 dicamib⁹ correctiuis refrigit tutiora sūt: ut est  
 medicamē philoniū: & troisci noīati de trib⁹  
 cōpositio uocata diatriton. uerū min⁹ stupefa  
 ciūt: & recētiora eorū uehemētī⁹: antiquora ue/  
 ro nihil. media uero mediocriter stupefaciūt.  
 Dolorq; p̄terea aliq; sūt ualidissimi q; tñ facillie  
 curāt i qbusdā tpib⁹ ut sūt q; ex spiritu flatuo/  
 so ortū hñt. Immo qñq; mitigāt ac eis sat est  
 irrigatio aq; calē supfudisse: uerū illd̄ remediū  
 unū min⁹ piculū: uidelicet ne si forte cā do/  
 loris fuerit aq̄a & existimat eē uētosus flat⁹ cui  
 si i initio p̄sertim supfudat aqua calida: auge/  
 bit nocumētū. Immo fortasse nocebit ēt in fla  
 tuoso cū nequerit flatū dissoluere: & expāsiō  
 q̄tītatis ei⁹ idē augebit: fomētatiōes ēt q; calefa  
 ciūt: uētositatē curāt. & iter huiusmodi me  
 dicamina p̄stātī⁹ ē qd̄ exiccat: ut miliū nisi for/  
 te illud mēbrū id nō sustinuerit: ut oculus q; q/  
 dē ipositiōe pānorū calidorū calefit: siūt adhuc  
 fomēta oleo calefacto: ualidi⁹ p̄terea fomētū ē  
 si farina erui ex aceto coq̄tur & exiccet deide  
 fiat ex ea fomētū. Ad id uero īferius remediū ē  
 fursuris decoctum: uapor p̄terea salis morder.  
 milii qdē eo p̄stātior uerū debili⁹ ē: qñq; ad/  
 huc sit fomētū ex aq; p̄ uesiculā: qd̄ qdē & tuti⁹

& lenius est. Verū nisi aiaduertat' efficeret qđ paulo ante dictū fuit. Ad hęc cucurbitulæ igni te sūt h<sup>9</sup> gñis maxieq; dolorē sedāt flatuosū: & si iteq; repetant' tollet' penitus dolor: uerū ex huiuscemodi remedio pōt accidere qđ supra dictū ē: sedat' p̄terea dolor leui deābulatiōe ac diuturna: p̄p̄ea qđ mollit: Itidē & tenues adi/pes satis noti. olea; iā nobis enarrata: porro suaui melodia musicalis. p̄sertim q̄ sōnū idu xerit. ac his quæ letitiam afferunt uacare. ualiv diffimum mitigant dolorem.

¶ Caput. 31. sen quartæ.

**S**I duo simul cōcurrāt morbi: ab eo icipiē/  
dū ē q̄ habet unū triū horū p̄prioꝝ: primū ē: ubi nō possit secūd<sup>9</sup> morb<sup>9</sup> curari nisi curet' ipsemet: ut aḡa & ulc<sup>9</sup> si cōiūgant'. p̄rio. n. aḡa curabim<sup>9</sup> donec mala itēperatura q̄ illi p̄iūcta ē auferat': q̄ existēti nō poterit ulc<sup>9</sup> curari. mox ulc<sup>9</sup> ipm curabit': secūdū ubi alter alteri<sup>9</sup> affectus fuerit cā: ut cū opilatio & febris coeant. pri<sup>9</sup>. n. opilationē: secūdo febrē curabim<sup>9</sup>. nec febrē timebim<sup>9</sup> ubi opilationē his q̄ calefaciūt aḡire uelim<sup>9</sup>. phthiſim uero exiccātib<sup>9</sup> curabim<sup>9</sup>: febrisq; i nulla erit p̄sideratōe. qm̄ ipossibile ē febrim tollet': ei<sup>9</sup> cā adhuc relicta cui<sup>9</sup> cāe curatio ē ipsa exiccatio: q̄ qđc febrī officit. Ter tiū uero ubi alter altero affectu piculosior fuerit: ut si febris cōtinēs (q̄ synochus noīat') cōiū gatur resolutioni (quā paralyſim uocāt). tunc